

GRUŹLICA I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO W POLSCE W 2025 ROKU



INSTYTUT GRUŹLICY
I CHOROBY PŁUC

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII I ORGANIZACJI WALKI Z GRUŹLICĄ

TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES IN POLAND IN 2025

Redaktor (editor):

Adam Nowiński

Współpraca (in collaboration):

Maria Korzeniewska – Koseła, Piotr Głaz, Bożena Mieczkowska, Renata Szostak,
Ewa Mańkiewicz

ISBN 978-83-957062-6-4

Przy publikowaniu danych z Biuletynu – prosimy o podanie źródła:

Gruźlica i Choroby Układu Oddechowego w Polsce w 2025 r. red. Adam Nowiński. Instytut
Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2026

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Uwagi techniczne	6
3. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce w 2025 roku... ..	7
4. Spis tabel i rycin	19
5. Definicje	29
6. Zachorowania i zapadalność na gruźlicę w 2025 roku – tabele i ryciny	32
7. Umieralność z powodu wybranych chorób układu oddechowego	113
8. Profile wojewódzkie.....	130
9. Informacje ogólne.....	148



01

WSTĘP

W niniejszym biuletynie zawarte są dane epidemiologiczne dotyczące gruźlicy w Polsce w 2025 roku.

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki należące do *Mycobacterium tuberculosis complex*. Chorobie tej można skutecznie zapobiegać, a w większości przypadków również ją wyleczyć.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku na gruźlicę zapada ponad 10 milionów osób, a ponad 1 milion umiera z jej powodu. Sprawia to, że gruźlica pozostaje najczęstszą na świecie przyczyną zgonów wywołanych przez pojedynczy czynnik zakaźny oraz znajduje się wśród 10 najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

Najczęstszą postacią choroby jest gruźlica płuc, jednak zmiany gruźlicze mogą występować również w innych narządach i układach. Taką postać choroby określa się jako gruźlicę pozapłucną. Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez drobnoustroje, które przenoszą się drogą kropelkową — najczęściej poprzez wydalenie bakterii do powietrza przez osobę chorą podczas kaszlu. Szacuje się, że zakażona prątkiem gruźlicy została około jedna czwarta populacji świata. Ryzyko rozwoju czynnej postaci choroby jest najwyższe w ciągu dwóch pierwszych lat od momentu zakażenia i wynosi około 5%; w kolejnych latach ryzyko to ulega znacznemu obniżeniu. U części osób dochodzi do samoistnego wyeliminowania zakażenia bez rozwoju objawów klinicznych.

Niepodejmowanie leczenia gruźlicy wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu — śmiertelność może sięgać nawet 50%. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wdrożenie zalecanej farmakoterapii — obejmującej 4–6-miesięczny schemat leczenia — umożliwia wyleczenie około 90% przypadków. W przypadku leczenia profilaktycznego zakażenia, stosuje się leczenie przeciwpłatkowe o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy.

Na ryzyko rozwoju gruźlicy oraz skuteczność jej leczenia istotny wpływ mają choroby współistniejące, a także czynniki społeczne i ekonomiczne. Skuteczna redukcja liczby zakażeń, zachorowań i zgonów z powodu gruźlicy wymaga podejmowania kompleksowych działań ukierunkowanych na eliminację kluczowych czynników ryzyka, takich jak ubóstwo, niedożywienie, zakażenie wirusem HIV, palenie tytoniu oraz cukrzyca.

Leczenie gruźlicy ma charakter długoterminowy i wymaga regularnego, codziennego stosowania kilku leków przeciwpłatkowych. Przerywanie terapii lub stosowanie nieprawidłowych schematów leczenia sprzyja rozwojowi oporności prątków na leki, prowadząc do wystąpienia gruźlicy lekoopornej. Szczególnie niebezpieczna jest postać wielolekooporna (MDR-TB), której leczenie jest znacznie bardziej skomplikowane, kosztowne i obciążone większym ryzykiem niepowodzenia, ze względu na konieczność stosowania specjalistycznych preparatów drugiego rzutu.

Dlatego wprowadzanie krótszych schematów terapeutycznych jest możliwe wyłącznie przy zapewnieniu skutecznego nadzoru nad prawidłowym przyjmowaniem leków przez pacjentów.

W Polsce dane o przypadkach gruźlicy gromadzone są w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę. Rejestr powstał w 1957 roku i od tego czasu jest w sposób ciągły prowadzony przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przygotowuje raporty o zachorowaniach na gruźlicę w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje analizy bieżącej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w naszym kraju i jej zmian zachodzących w czasie. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy oceniana jest poprzez takie wskaźniki jak: zapadalność ogólna w grupach wieku i płci, udział nowych zachorowań i wznów oraz gruźlicy płuc i pozapłucnej, zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie, zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego płwociny oraz posiewu, odsetek cudzoziemców i więźniów wśród ogółu chorych, współwystępowanie gruźlicy i HIV, udział gruźlicy wywołanej przez prątki odporne na leki i umieralność z powodu gruźlicy.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przekazuje dane o gruźlicy w Polsce do Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz do WHO, które przygotowują zbiorcze raporty z krajów i prowadzą ponadnarodowy nadzór nad gruźlicą.

W Polsce istnieje prawny obowiązek zgłaszania zachorowań na gruźlicę. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1284 tj.) oraz o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 416 tj.) nakładają ten obowiązek na lekarzy i felczerów. Zgodnie z tymi ustawami, lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest obowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Dane o zachorowaniach na gruźlicę, zebrane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, przekazywane są do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

02

UWAGI TECHNICZNE

Dane o zapadalności na gruźlicę, przedstawione w niniejszym biuletynie, pochodzą w całości z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę. Dane o umieralności z powodu gruźlicy zostały zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Statystyczna kategoria dotycząca zgonów z powodu gruźlicy zawiera przypadki, w których na karcie zgonu jako wyjściową przyczynę śmierci osoby podano gruźlicę. Z GUS pochodzą także przedstawione w biuletynie informacje o umieralności z powodu innych chorób układu oddechowego.

W biuletynie zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne: liczby bezwzględne, odsetki i współczynniki surowe (obliczone na 100 000 populacji). Współczynniki zapadalności/umieralności w określonej grupie wieku wyrażano na 100 000 populacji w danej grupie wieku (w tekście liczba 100 000 bywa pomijana). Obok informacji o zachorowaniach w 2025 roku umieszczono (w nawiasach) dane odnoszące się do poprzedniego roku. Zebrane przez GUS dane na temat umieralności na gruźlicę i z powodu innych chorób układu oddechowego dotyczą roku 2024. W tej części biuletynu, w której przedstawiono dane o umieralności, obok wyniku z 2024 roku podano w nawiasie odnośny wynik z roku 2023.

Informacje o nowotworach złośliwych pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów, prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i odnoszą się do roku 2023.

Wskaźniki zapadalności dot. gruźlicy obliczano wg. stanu ludności na 30.06.2025 roku.

Wskaźniki umieralności na gruźlicę i inne choroby płuc (dane GUS) wg. stanu ludności na 30.06.2024 roku

Wskaźniki zapadalności i umieralności na nowotwory złośliwe wg. stanu ludności na 30.06.2023 roku.



03

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA GRUŹLICY W POLSCE W 2025 ROKU

ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ

W 2025 roku zarejestrowano 3829 (4236) zachorowań na gruźlicę, co oznacza 407 przypadków gruźlicy mniej niż w roku poprzednim i 2208 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2016.

W 2025 roku zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wynosiła 10,2 (11,3) i była niższa o 9,7 % w porównaniu z rokiem 2024 i mniejsza o 39,3% w porównaniu z rokiem 2016, w którym wynosiła 16,8.

W kolejnych latach ostatniego pięciolecia (2021-2025) zmiany zapadalności przedstawiały się jak następuje: 10,2%, 17,5%, 3,5%, (-) 4,2% i (-)9,7%. W ocenianym pięcioleciu nastąpił wzrost zapadalności – wynosił średnio 1,4%, w przeciwieństwie do poprzedniego pięciolecia (2016–2020), w którym średni roczny spadek wynosił – 11,0%. Obserwowane zaburzenia wieloletniego, dość stabilnego trendu spadkowego wystąpiły w okresie pandemii wirusa COVID-19 co wpłynęło na wyżej wymienione obserwacje. Duży spadek zapadalności w roku 2020 był związany z utrudnioną diagnostyką i rozpoznawaniem gruźlicy, co przełożyło się na relatywny wzrost zapadalności w kolejnych latach, po powrocie systemu diagnostyki i leczenia gruźlicy do normalnej pracy.

Nowych przypadków gruźlicy, bez historii wcześniejszego leczenia gruźlicy, było w 2025 roku 3374 (3737), współczynnik 9,0 (9,9), stanowiły 88,1% (88,2%) ogółu zachorowań. Ponowne zachorowania – w liczbie 455 (499) – współczynnik 1,2 (1,3) – stanowiły 11,9% (11,8%) wszystkich zgłoszonych przypadków.

Najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc, która stanowiła w 2025 roku 96,1% (96,6%) wszystkich zachorowań. Zarejestrowano 3681 (4093) przypadków gruźlicy płuc – współczynnik 9,8 (10,9). W 18 (25) przypadkach gruźlica płuc występowała razem z gruźlicą pozapłucną. Chorzy z jednoczesnym zajęciem procesem gruźliczym płuc i innych narządów są rejestrowani jako przypadki gruźlicy płuc. Chorzy tylko na gruźlicę pozapłucną – 148 (143) przypadków – współczynnik 0,4 (0,4) stanowili 3,9 (3,4%) ogółu chorych w 2025 roku. Podobnie jak w latach wcześniejszych, najczęstszą postacią gruźlicy pozapłucnej (uwzględniono tylko chorych bez współwystępujących zmian w płucach) było gruźlicze zapalenie opłucnej – 50 (47) zachorowań – 33,8% (32,9%) wszystkich przypadków o lokalizacji pozapłucnej. Na drugim miejscu była gruźlica obwodowych węzłów chłonnych – 28 (24) chorych, kolejno gruźlica kości i stawów 23 chorych, w tym 4 przypadki gruźlicy kręgosłupa, następnie 13 chorych na gruźlicę układu moczowo-płciowego (w tym 1 osoba na gruźlicę narządów płciowych), kolejno 10 chorych

na gruźlicę węzłów chłonnych klatki piersiowej, 6 na gruźlicę skóry. 4 osoby zachorowały na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W roku 2025 nie zarejestrowano zachorowań na tę postać gruźlicy u dzieci (0-14 lat) i młodzieży (15-19 lat). U jednej osoby dorosłej odnotowano gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu współistniejące z gruźlicą płuc.

W 2025 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę był tym większy, im starsza była grupa wieku, której dotyczył, ale tylko do wieku 45-64 lata. Współczynniki wynosiły od 1,2 (0,9) wśród dzieci do 14 roku życia do 16,0 (17,9) u osób w wieku od 45 do 64 lat. Chorzy w wieku od 45 do 64 lat stanowili największy odsetek ogółu chorych na gruźlicę 41,8% (41,8%). W kolejnych latach ostatniego dziesięciolecia największe współczynniki zapadalności stwierdzano w grupie wieku 45-64 lat, wyższe niż w najstarszej grupie wieku tzn. u osób ≥ 65 lat. Do 2015 roku największe współczynniki zapadalności rejestrowane były w najstarszej grupie wiekowej. Również w 2025 roku współczynnik zapadalności u osób w wieku 65 lat i starszych wynosił 12,3 (13,8) i był mniejszy niż w grupie wieku od 45 do 64 lat – 16,0.

Zgłoszono 64 (51) przypadki gruźlicy u dzieci do 14 roku życia, co stanowiło 1,7% (1,2%) ogółu zachorowań. U dzieci wykryto 54 (47) przypadki gruźlicy płuc i 10 (4) przypadków gruźlicy pozapłucnej. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano w 24 (14) przypadkach gruźlicy u dzieci, tzn. w 37,5% (27,5%) zachorowań pediatrycznych. Wśród przypadków z pewnym rozpoznaniem gruźlicy, potwierdzonym posiewem, było 21 (13) przypadków gruźlicy płuc (co stanowiło 38,9% wszystkich zachorowań na gruźlicę płuc u dzieci) oraz 3 (1) przypadki gruźlicy pozapłucnej. U czworga dzieci dodatni był także wynik badania bakterioskopowego plwociny. Największą liczbę przypadków z potwierdzeniem bakteriologicznym odnotowano w woj. małopolskim i świętokrzyskim po 4 przypadki, co stanowiło 100% ogółu zachorowań w woj. świętokrzyskim i 33,3% zachorowań w woj. małopolskim. W 2025 roku większą niż w roku poprzednim liczbę przypadków pediatrycznych odnotowano w 8 województwach: małopolskim – (12 vs 0), pomorskim (13 vs 8), lubuskim (8 vs 1), w województwach: woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim po 2 przypadki (w ubiegłym roku nie było zachorowań wśród dzieci w tych województwach). W ciągu ostatniego pięciolecia w woj. warmińsko-mazurskim dopiero w 2025 roku odnotowano 2 przypadki zachorowań wśród dzieci. W województwach: dolnośląskim, opolskim i podkarpackim i zachodniopomorskim stwierdzono po jednym przypadku gruźlicy dziecięcej. W jednym województwie – podlaskim – nie zarejestrowano żadnego zachorowania w tej grupie wieku. Największe współczynniki zapadalności na gruźlicę u dzieci stwierdzono w województwach: lubuskim (5,9 vs. 0,7), woj. pomorskim (3,5 vs 2,1), świętokrzyskim (3,5 vs 2,1) i małopolskim 2,3 vs 0).

W 2025 roku zarejestrowano 37 (68) zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynnik 1,8 (3,5). Zapadalność w tej grupie była niższa o 48,6% od zapadalności na gruźlicę w tej grupie wiekowej w ubiegłym roku. Większość młodocianych chorych 94,6% (92,6%) miała gruźlicę płuc. Potwierdzenie bakteriologiczne gruźlicy uzyskano u 21 (58) nastolatków, czyli u 56,8% (85,3%) tej grupy chorych. U 14 nastoletnich chorych na gruźlicę płuc dodatni był także wynik bakterioskopii plwociny. W 3 województwach nastąpił wzrost zapadalności na gruźlicę w tej grupie wiekowej, największy w woj. małopolskim - 2,2 (0,6), opolskim - 6,6 (2,3) i śląskim - 3,2 (2,8). W 11 województwach nastąpił spadek

zapadalności w woj. zachodniopomorskim – 1,2 (8,4), wielkopolskim – 1,0 (4,2) i lubuskim – 1,8 (5,7). W woj. podlaskim od trzech lat nie odnotowano zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży (15- 19 lat).

Największą liczbę chorych na gruźlicę w wieku od 15 do 19 lat zarejestrowano w woj. śląskim – 7 (6), w czterech województwach po 3 przypadki: kujawsko-pomorskim -3 (8), małopolskim -3 (1) i pomorskim 3 (8). W województwie lubelskim, podkarpackim i podlaskim nie zarejestrowano żadnego przypadku gruźlicy u osób w wieku od 15-19 lat. W woj. warmińsko-mazurskim odnotowano taką samą zapadalność jak w ubiegłym roku. Największą zapadalność na gruźlicę u nastolatków – stwierdzono w woj. opolskim 6,6 (2,3), kujawsko-pomorskim – 3,6 (7,5) i śląskim – 3,2 (2,8). Największą zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie u młodzieży odnotowano w województwach: woj. opolskim – 2,2 (-), po 1,8 w woj. lubuskim i śląskim (w 2024 r woj. lubuskie -5,7, woj. śląskie – 2,4). Na taką postać gruźlicy zachorowało najwięcej - 4 osoby w woj. śląskim. W 3 województwach: lubelskim, podkarpackim i podlaskim nie było ani jednego zachorowania na potwierdzoną bakteriologicznie gruźlicę płuc u nastolatków. Największą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii płwociny u młodzieży stwierdzono w woj. opolskim - 2,2.

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zapadalność na gruźlicę wśród mężczyzn była większa niż u kobiet. Zarejestrowano 2888 (3141) przypadków gruźlicy u mężczyzn – współczynnik – 16,0 (17,3) i 941 (1095) u kobiet – współczynnik 4,9 (5,6). Przypadki gruźlicy u mężczyzn stanowiły 75,4% (74,2%) ogółu zachorowań. Największa różnica zapadalności między mężczyznami a kobietami występowała u osób w wieku od 55-59 lat (32,0 vs 5,0), 60-64 lat (32,0 vs 6,0), 50-54 lat (26,8 vs 5,5) i 65-69 lat (23,2 vs 5,9). Największą zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci u mężczyzn stwierdzono w woj. śląskim – współczynnik 23,6, najmniejszą w woj. wielkopolskim – współczynnik – 7,7. Największy współczynnik zapadalności na gruźlicę u kobiet stwierdzono w woj. lubuskim – 8,8 zaś najmniejszy – 2,6 - w woj. wielkopolskim. Współczynnik zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wynosił u mężczyzn 13,2 (14,2); u kobiet – 3,6 (4,2).

W 2025 roku po raz kolejny zapadalność na gruźlicę mieszkańców miast była większa niż u ludności wiejskiej. Zarejestrowano 2518 (2731) zachorowań w miastach i 1311 (1505) przypadków gruźlicy na wsi. Współczynnik zapadalności u mieszkańców miast wynosił 11,3 (12,2); u mieszkańców wsi – 8,6 (9,9).

Znaczne różnice współczynników zapadalności na gruźlicę między województwami, obserwowane od lat, wystąpiły także w roku 2025. W 2025 roku największą zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci stwierdzono w województwach: śląskim – 14,5 (16,7), lubuskim – 13,9 (12,3) i lubelskim – 13,6 (16,4). W województwach: wielkopolskim – 5,1 (5,9), warmińsko-mazurskim – 6,7 (7,8) i podlaskim – 7,5 (7,5) współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci były najmniejsze w całym kraju. W 2025 roku wzrost zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił w 3 województwach. Największy w woj. lubuskim – 13,9 (12,3) wzrost o 13,0%, małopolskim – 10,6 (9,0) wzrost o 17,8% i kujawsko-pomorskim – 10,4 (9,7) wzrost o 7,2%. W większości województw – 12 współczynnik zapadalności był niższy niż w 2024 roku. Największy spadek zapadalności odnotowano w woj.

mazowieckim – 8,9(10,9) – spadek o 18,3%, w woj. dolnośląskim – 11,0 (13,4) – spadek o 17,9% i woj. lubelskim – 13,6 (16,4) – spadek o 17,1%.

Największe w kraju współczynniki zapadalności na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie, czyli rozpoznaną w sposób pewny, stwierdzono w województwach: śląskim – 11,3 (12,1), lubuskim – 10,2 (10,5) i świętokrzyskim – 9,7 (9,1). W województwach: wielkopolskim – 4,8 (5,4), warmińsko-mazurskim – 5,6 (6,1) i opolskim – 5,8 (8,6) zapadalność na gruźlicę potwierdzoną w posiewach była najmniejsza w kraju.

W 2025 roku gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie u 3180 (3484) chorych, w tym w 3085 (3391) przypadkach gruźlicy płuc. Zapadalność na wszystkie postaci gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wynosiła 8,5 (9,3); zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewach – 8,2 (9,0). Chorzy z potwierdzeniem bakteriologicznym stanowili 83,1% (82,2%) ogółu chorych. Wśród chorych na gruźlicę płuc odsetek ten wynosił 83,8% (82,8%) tej grupy chorych. W całej grupie 148 (143) chorych na gruźlicę pozapłucną rozpoznanie potwierdzono bakteriologicznie u 95 (93) – 64,2% (65%). Utrzymują się duże różnice między województwami odnośnie odsetka zachorowań na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie: od 69,4% w woj. łódzkim; 70,3% w woj. lubelskim, 70,7% w woj. opolskim do 94,6% w woj. wielkopolskim, 93,1% w woj. mazowieckim, 91,9% w woj. pomorskim.

Chorzy na gruźlicę płuc, u których prątki stwierdzono także w bakterioskopii, stanowili 54,9% (55,4%) wszystkich chorych na gruźlicę płuc i 65,5% (66,9%) chorych na gruźlicę płuc z potwierdzeniem bakteriologicznym. Zarejestrowano 2022 (2269) takich przypadków, współczynnik – 5,4 (6,0). Największą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii odnotowano w woj. śląskim – 7,3 (8,1), lubuskim – 7,1 (7,3), dolnośląskim – 6,9 (9,4), najniższą w woj. wielkopolskim – 3,1 (3,6), warmińsko-mazurskim – 3,2 (4,5) i łódzkim – 4,1 (3,8). Największy odsetek chorych z dodatnim wynikiem bakterioskopii wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc stwierdzono w woj. dolnośląskim – 66,8%, najmniejszy w łódzkim – 37,7%.

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2025 roku było 349 (376) cudzoziemców, w większości, 234 (263) osób, w wieku od 20 do 44 lat. Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły 9,1 % (8,9%) wszystkich zachorowań. Wśród cudzoziemców chorych na gruźlicę było 5 zachorowań u dzieci do 14 roku życia, 5 przypadków odnotowano u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Najwięcej cudzoziemców 102 leczono z powodu gruźlicy na Mazowszu. Największą grupę, 223 osób, stanowili przybysze z Ukrainy; drugą co do liczebności, zdecydowanie mniejszą grupą byli Hindusi (15) i Indonezyjczycy (15) i taka sama grupa Nepalczyków (15). Cudzoziemcy, u których rozpoznano gruźlicę, przybyli do Polski z 30 krajów świata. W 7 przypadkach kraj pochodzenia nie był znany. W 2025 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, współwystępowanie gruźlicy i HIV było w Polsce zjawiskiem rzadkim. Wg. danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, gruźlica była chorobą wskaźnikową AIDS u 28 (20) osób zakażonych HIV. Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2025 roku odnotowano 180 (145) osób, które przebywały w aresztach śledczych i zakładach karnych (zapadalność 2570 na 100 000 osadzonych).

Zgodnie ze zbiorczym sprawozdaniem MZ-13, odnoszącym się do osób leczonych z powodu gruźlicy w poradniach gruźlicy i chorób płuc we wszystkich województwach, wśród których są także chorzy, którzy rozpoczęli leczenie jeszcze przed 2025 rokiem, w roku 2025

leczono ambulatoryjnie 259 przypadków gruźlicy z opornością na co najmniej 1 lek przeciwpłatkowy. W tej grupie było 185 chorych na gruźlicę wielolekooporną (MDR-TB). Najwięcej chorych na MDR-TB pozostawało pod opieką poradni w woj. pomorskim – 77 i zachodniopomorskim – 35, dolnośląskim - 34.

Zgodnie z danymi z rejestru Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, potwierdzonego rejestrami laboratoryjnymi MDR-TB rozpoznano w 2025 roku u 92 chorych. U ośmiu chorych stwierdzono izolowaną oporność prątków na ryfampicynę. Zbiorczo gruźlica wielolekooporna i z opornością na ryfampicynę (MDR/RR-TB) została więc stwierdzona u 100 pacjentów. W grupie chorych na MDR-TB było 86 przypadków gruźlicy płuc i 6 przypadków gruźlicy pozapłucnej, 66 chorych było cudzoziemcami. Przypadki MDR-TB stanowiły 2,9% wszystkich zachorowań na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie oraz 3,2% zachorowań ze znaną lekowrażliwością (w 2025 roku wyniki lekowrażliwości były dostępne u 89,7% chorych z dodatnimi wynikami posiewów). Było ponadto 85 chorych z opornością wyłącznie na izoniazyd (2,7% chorych na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie i 3,0% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości).

W 2025 roku u 10 chorych na gruźlicę stwierdzono prosówkę gruźliczą. Odnotowano 1 przypadek gruźlicy włóknisto-jamistej. Większość chorych, czyli 95,4 %, miała gruźlicę naciekową płuc.

UMIERALNOŚĆ

W 2024 roku gruźlica była przyczyną zgonu 448 (483) osób. Współczynnik umieralności wynosił 1,2 (1,3) na 100 000 ludności. Główną przyczyną zgonów z powodu gruźlicy, podobnie jak w latach wcześniejszych, była gruźlica płuc – zmarło na nią 437 (465) chorych – współczynnik umieralności wynosił 1,2 (1,2). Z powodu gruźlicy pozapłucnej zmarło 11 (18) chorych. Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,1% ogółu zgonów w 2024 roku w Polsce i 20,7% zgonów z powodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Najwięcej osób zmarłych z powodu gruźlicy było w wieku od 45 do 64 lat – 205 (220); współczynnik umieralności u osób w tym wieku wynosił 2,1 (2,2). Od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do 2020 roku największe współczynniki umieralności z powodu gruźlicy stwierdzano u osób ≥ 65 lat, w latach 2021 i 2022 największą umieralność odnotowano w młodszej grupie wieku - od 45 do 64 lat. W 2023 i 2024 roku najwyższy współczynnik umieralności – 2,4 – był stwierdzony ponownie w najstarszej grupie wiekowej. W 2024 roku nie odnotowano zgonów z powodu gruźlicy płuc u dzieci (0-14). Nie zarejestrowano zgonu z powodu gruźlicy w grupie nastolatków.

W 2024 roku liczba mężczyzn zmarłych w Polsce z powodu gruźlicy, 364 (384) była 4,3 x większa niż kobiet, 84 (99); współczynniki umieralności odpowiednio – 2,0 (2,1) i 0,4 (0,5). Największe w kraju współczynniki umieralności z powodu gruźlicy wszystkich postaci zarejestrowano w 2024 roku w województwie śląskim – 2,3 (2,6) - 83 zgony, warmińsko-mazurskim – 1,6 (1,5) – 22 zgony, pomorskim - 1,4 (1,2) – 33 zgony, zaś najmniejsze w woj. małopolskim – 0,6 (20 zgonów) wielkopolskim - 0,8 (27 zgonów) i tyle samo w podkarpackim – 0,8 – 17 zgonów. Wzrost współczynnika umieralności w porównaniu z rokiem poprzednim

odnotowano w 2024 roku w sześciu województwach, największy w woj. podlaskim - od 0,4 do 1,0, kujawsko-pomorskim – od 1,1 do 1,3. Największy spadek umieralności wystąpił w woj. świętokrzyskim - 1,9 do 0,9, lubuskim - od 1,8 do 1,0, opolskim od 1,3 do 0,9. W województwach małopolskim i podkarpackim umieralność była taka sama jak w ubiegłym roku. Umieralność z powodu gruźlicy w 2024 roku była większa wśród mieszkańców miast niż wsi – 1,2 vs 1,1.

Najwięcej osób zmarło z powodu gruźlicy na Śląsku (81 mężczyzn i 17 kobiet), najmniej w woj. opolskim - 8 (byli to mężczyźni). We wszystkich województwach umieralność z powodu gruźlicy była większa u mężczyzn.

Przy uwzględnieniu płci największy w Polsce współczynnik umieralności z powodu gruźlicy zarejestrowano w 2024 roku u mężczyzn w woj. śląskim – 3,9, kujawsko-pomorskim i pomorskim – po 2,4, najmniejszy u kobiet w trzech województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim po 0,2. W woj. opolskim nie odnotowano zgonów z powodu gruźlicy w grupie kobiet.

WYKRYWANIE CHORYCH

Informacje o sposobie wykrycia przypadków gruźlicy płuc w 2025 roku wskazują, że w Polsce najczęstszą metodą wykrywania takich zachorowań było wykrywanie bierne, tzn. z powodu objawów chorobowych u osób, które same zgłosiły się do placówki medycznej. Z powodu objawów wykryto 93,2% przypadków gruźlicy płuc, w tym 94,8% chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną w badaniu bakteriologicznym i 84,6% chorych na gruźlicę płuc bez potwierdzenia w posiewie. Największy odsetek przypadków gruźlicy płuc wykryto metodą bierną w województwach: podkarpackim – 99,4%, zachodniopomorskim - 98,8% i świętokrzyskim - 98,3%, najmniejszy w woj. opolskim- 77,3%, 2,6%.

W grupie wszystkich chorych na gruźlicę płuc, 2,6% przypadków, wykryto przy okazji badania osób z kontaktu; 2,8% przy innych badaniach profilaktycznych i 1,4% w innych okolicznościach, jak hospitalizacja z różnych przyczyn lub badanie sekcyjne.

SZCZEPIENIA BCG

W roku 2025 szczepienie BCG wykonano u 219 098 (230 336) noworodków, które stanowiły 92,0% ogółu dzieci żywo urodzonych w Polsce. Najmniejsze odsetki zaszczepionych noworodków stwierdzono w woj. lubelskim – 89,1%, małopolskim – 89,6% i dolnośląskim - 90,1%, największe w woj. mazowieckim – 94,7%, wielkopolskim – 94,4%, i łódzkim - 94,0%. (dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny).

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMIERALNOŚCI Z POWODU WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO W POPULACJI POLSKIEJ

Choroby układu oddechowego, w tym nowotwory układu oddechowego i gruźlica płuc były w 2024 roku przyczyną 13,7% (13,6%) zgonów w Polsce. W poniższym zestawieniu przedstawiono dane o zgonach z następujących przyczyn:

- nowotwory złośliwe tchawicy i płuca/także dane o zachorowalności/
- przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (-J40-J44)
- astma oskrzelowa
- zapalenie płuc

Statystyczne dane dotyczące przyczyn umieralności pochodzą z kart zgonu. W tabelach przedstawiono liczebności i współczynniki umieralności z powodu w/w chorób w kolejnych latach.

W roku 2024 choroby układu oddechowego łącznie z gruźlicą płuc, nowotworami układu oddechowego i zespołem serca płucnego uznano za przyczynę zgonu 56 111 (55 502) osób. Współczynnik umieralności z powodu tych wszystkich chorób wyniósł 150,0 (147,7)/100 000.

Choroby układu oddechowego bez zespołu serca płucnego, nowotworów i gruźlicy (J00 - J99, klasyfikacja wg. ICD-10) były w 2024 roku przyczyną zgonu 31 821 (30 382) osób; współczynnik umieralności wyniósł 85,1 (80,6). Większość zgonów w tej grupie stanowiły zgony z powodu zapalenia płuc i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Z powodu ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych zmarło w 2024 roku 29 osób. W roku 2024 zarejestrowano 21 537 (19 976) zgonów z powodu zapalenia płuc. Zgony z powodu zapalenia płuc dotyczyły głównie osób w wieku 70 lat i starszych. Współczynnik umieralności z powodu zapalenia płuc w tej grupie wieku był ponad pięciokrotnie większy niż u osób w wieku od 60 do 69 lat (57,3) i wynosił 330,1 na 100 000; u mężczyzn 407,1; u kobiet 282,9. W całej populacji wyniósł 57,3. Współczynniki umieralności z powodu zapalenia płuc były większe u płci męskiej we wszystkich grupach wieku, oprócz osób pomiędzy pierwszym a dziewiątym r.ż. Największe zmiany umieralności z powodu zapalenia płuc nastąpiły w ciągu lat u niemowląt. W 1970 roku umieralność z powodu zapalenia płuc wynosiła u dzieci w pierwszym roku życia 628,2 na 100 000 (w 2024 roku 13,2 na 100 000).

W 2024 roku liczba osób, które zmarły z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40 - J44), była większa niż w roku poprzednim – 5679 vs 5359; współczynnik umieralności wynosił 15,2 (14,2). Współczynniki umieralności z tej przyczyny są od lat większe u mężczyzn, największe, z dużym wzrostem, u osób w wieku ≥ 70 lat. W 2024 roku z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych zmarło 2368 (2214) mężczyzn – 121,4 (118,8) na 100 000 ≥ 70 lat (współczynnik umieralności u mężczyzn w wieku od 60 do 69 lat – 31,6 (31,9) na 100 000).

Współczynnik umieralności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP- J44) wyniósł w 2024 roku 14,8 (13,9). Z tej przyczyny zmarło 5557 (5227) chorych. Współczynniki umieralności z powodu POChP rosły z wiekiem i były większe u mężczyzn, co jest zjawiskiem obserwowanym od lat. Największy stwierdzono u osób w wieku ≥ 70 lat – 82,9 (78,7) na 100 000 (u mężczyzn w tym wieku współczynnik umieralności z powodu POChP był ponad dwukrotnie większy niż u kobiet – 118,6 vs. 61,0 na 100 000). Osoby w wieku ≥ 70 lat stanowiły większość zmarłych na POChP (76,4).

W 2024 roku zarejestrowano 468 zgonów z powodu astmy oskrzelowej (w 2023 roku 557); współczynnik 1,2 (1,5) na 100 000 jest niższy niż w poprzednim roku. Największą umieralność z tej przyczyny – współczynnik 7,0 (8,4) na 100 000 – stwierdzono u osób ≥ 70 roku życia, większy u kobiet – 7,1 vs 6,9. Nie było zgonów na astmę u dzieci i nastolatków, a także w grupie 20-29 lat. Umieralność z powodu astmy zmniejszyła się w ciągu lat znacząco. W 1970 roku współczynnik umieralności z powodu astmy wynosił 14,2; w 2000 roku – 3,6; w roku 2010 – 1,1, w 2020 i kolejnym 2021 - po 1,6 na 100 000, w 2022 i 2023 roku – wynosił po 1,5.

Nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. W roku 2023 (z tego roku pochodzą dane udostępnione przez Narodowy Instytut Onkologii) odnotowano kolejny wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe (C00-D09, klasyfikacja wg. ICD-10) – współczynnik zapadalności wyniósł 511,8 (479,3) na 100 000, po spadku zapadalności w roku 2020 (385,6 vs. 446,0 w roku 2019), która mogła być skutkiem zaburzeń funkcjonowania ochrony zdrowia wywołanych pandemią COVID-19. Na wszystkie nowotwory zachorowało w kraju 192 922 (181 300) osób. Na nowotwory złośliwe tchawicy i płuca (C33-34) zachorowało 21 068 (20 739) osób: 12274 (12 286) mężczyzn i 8794 (8453) kobiet. Zapadalność na nowotwory złośliwe tchawicy i płuca (C33-C34) wynosiła ogólnie 55,9 (54,8) na 100 000; 67,4 (67,2) u mężczyzn i 45,1 (43,2) u kobiet.

Na nowotwory złośliwe płuca C34 (bez nowotworów tchawicy C33) zachorowało w 2023 roku 12254 (12 278) mężczyzn i 8791 (8448) kobiet. Biorąc pod uwagę wszystkich chorych na nowotwory złośliwe płuca (C34), największy współczynnik – 359,4 (361,1) na 100 000 odnotowano u mężczyzn w wieku od 70 do 79 lat. Kobiety w tej grupie wieku także miały współczynnik zapadalności na raka płuca większy niż pozostałe – 195,6 (181,2) na 100 000 (w roku 2020 – 147,7). Do roku 2015, w odniesieniu do kobiet, największe współczynniki zapadalności na tę postać nowotworów złośliwych stwierdzano u osób w wieku od 60 do 69 lat. Od 2016 roku największe współczynniki zapadalności wśród kobiet rejestrowane są w grupie wieku 70-79 lat. W populacji mężczyzn od blisko 15 lat obserwuje się spadek zachorowalności i umieralności na nowotwory płuca, natomiast u kobiet następuje wzrost zapadalności na nowotwory płuca (C34).

Współczynniki zapadalności na nowotwory różnią się znacznie między województwami. Największą zapadalność na nowotwory złośliwe C33-34 u kobiet odnotowano w 2023 roku w województwie warmińsko-mazurskim – 67,1, kujawsko-pomorskim – 66,2, dolnośląskim – 54,6 i podobne w zachodniopomorskim – 54,5 na 100 000; najmniejszą w województwie małopolskim – 24,1, podkarpackim – 27,2 na 100 000; u mężczyzn największe współczynniki zapadalności na nowotwory złośliwe C33-34 stwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim – 96,1,

warmińsko-mazurskim – 93,8 i świętokrzyskim – 93,2; najmniejsze w województwie małopolskim – 47,4, podkarpackim – 54,6 i podlaskim 56,2 na 100 000.

Nowotwory złośliwe płuca są drugim nowotworem mężczyzn (12,6%), nadal pozostają dominującą nowotworową przyczyną zgonu (25,4%). Najczęstszym nowotworem złośliwym mężczyzn jest nowotwór gruczołu krokowego (24,5%), na trzecim miejscu jelita grubego (11,4%). W populacji kobiet nowotwory złośliwe najczęściej zajmują piersi – 22,6 %, skórę - 10,1% płuca - 9,2% i tyle samo – 9,2% jelito grube. Nowotwory złośliwe płuca utrzymują od 10 lat pierwszą pozycję wśród nowotworowych przyczyn zgonu u kobiet (18,6%), wyprzedzając nowotwory piersi (14,6%).

W 2023 roku z powodu nowotworów złośliwych (C00-D09) zmarło w Polsce łącznie 96 676 (96 062) osób; współczynnik 264,4 (253,9) na 100 000. Na nowotwory złośliwe tchawicy i płuca (C33-C34) zmarło 22 168 (20 977) osób, 13 560 (13 042) mężczyzn i 8608 (7935) kobiet; współczynniki umieralności u mężczyzn i kobiet wynosiły odpowiednio 74,4 (71,3) i 44,2 (40,6); dla całej populacji – 58,8 (55,5) na 100 000. Na raka płuca (C34) zmarło w 2023 roku 13 553 (13 034) mężczyzn (współczynnik umieralności 74,4 na 100 000) i 8602 (7922) kobiety (współczynnik umieralności 44,1 (40,5) na 100 000).

Nowotwór złośliwy płuca jest na pierwszym miejscu wśród nowotworowych przyczyn zgonów u mężczyzn we wszystkich województwach (od 19,2% w zachodniopomorskim i 15,6% w woj. łódzkim do 11,1% w woj. podkarpackim, 11,4% w woj. lubelskim i 11,5% w woj. podlaskim). Największą umieralność z powodu nowotworów złośliwych C33-C34 stwierdzono u mężczyzn z woj. zachodniopomorskiego – 93,0 na 100 000; najmniejszą z woj. podkarpackiego – 55,7 na 100 000.

W 2023 roku rak płuca był na czele nowotworowych przyczyn zgonów u kobiet w 14 województwach. W woj. małopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim najczęstszą przyczyną zgonów onkologicznych był rak piersi. U kobiet największą umieralność z powodu nowotworów złośliwych C33-C34 stwierdzono w woj. zachodniopomorskim – 60,7, kujawsko-pomorskim – 53,9 i lubuskim – 52,5, najmniejszą- w woj. podkarpackim – 24,7 na 100 000, 29,2 w woj. podlaskim i 32,0 w woj. małopolskim na 100 000. W 2023 roku współczynnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych C33-C34 był w Polsce 49 razy większy niż współczynnik umieralności z powodu gruźlicy.

Piśmiennictwo: Didkowska JA, Wojciechowska U, Irzyk M, Rogalski M, Olasek P, Jawołowska A, Filipek P, Dybek M Nowotwory złośliwe w Polsce w 2023 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2025.



INTRODUCTION

This bulletin provides an updated overview of the epidemiological situation of tuberculosis (TB) in Poland in 2025. It is part of a series of annual reports published for many years by the Department of Epidemiology and Tuberculosis Surveillance at the Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw, with the aim of providing a comprehensive overview of the current TB epidemiological situation in the country.

The report presents both absolute numbers of TB cases and notification rates per 100,000 population. In addition to data on TB incidence, it includes information on methods of case detection and TB-related mortality in 2024. The tables are designed to be self-explanatory, with data from the previous year provided in parentheses for comparison.

The epidemiological situation is analyzed for all forms of TB. The report also presents data on drug-resistant TB and TB among foreign-born individuals, people in prisons, and people living with HIV. TB case notification has been mandatory in Poland since 1957 and is regulated by national law.

TB INCIDENCE IN POLAND IN 2025

In 2025, a total of 3829 (4,236) TB cases were reported in Poland. The incidence rate was 10.2 (11.3) cases per 100,000 population, with significant variation across voivodeships—from 5.1 to 14.5 per 100,000.

In 2025, the total number of pulmonary TB cases was 3681(4,093), which equals 9.8 (10.9) per 100,000. Pulmonary TB accounted for 96.1% (96.6%) of all TB cases. A total of 148 (143) extrapulmonary TB cases were reported. Across the country, 64 (51) TB cases were recorded among children. TB in children accounted for 1.7% (1.2%) of all TB cases reported in Poland in 2024.

TB incidence increased with age—from 1.7 per 100,000 among children to 16.0 per 100,000 in the 45–64 age group (the highest incidence rate). In the 65+ age group, incidence in 2024 was 12.3 per 100,000.

TB incidence among men was 16.0 (17.3) per 100,000—three times higher than among women, at 4.9 (5.6) per 100,000. Incidence was lower in rural than in urban areas: 8.6 (9.9) vs. 11.3 (12.2) per 100,000, respectively.

In 2025, there were 3180 (3484) TB cases with positive culture results. Pulmonary TB was bacteriologically confirmed in 3085 (3391) individuals. Culture-positive cases accounted for 83.1% (82.2%) of all TB cases. Pulmonary TB cases with positive sputum culture results accounted for 82.8% (81.1%) of all pulmonary TB cases. The number of pulmonary TB cases with positive smear microscopy in 2025 – was 2022 cases – 5.4 (6.0) per 100,000—representing 54.9% (55.4%) of all pulmonary TB cases and 65.5 % of bacteriologically confirmed cases.

TB was an AIDS-defining illness in 28 (20) HIV-positive individuals. Among all TB patients in Poland in 2025, there were 100 MDR/RR-TB cases (including 66 foreign-born) and 85 cases resistant only to isoniazid. In 2025, 349 (376) TB cases, 9.1 (8.9)% of all TB cases were reported among foreign-born individuals.

CASE DETECTION METHODS

In 2025, 93.2% of pulmonary TB cases were diagnosed based on clinical symptoms. Screening among contacts of TB patients detected 2.6% of cases; other preventive measures accounted for 2.8%, and other detection methods—1.4% (including hospitalization for reasons other than TB, and autopsy).

TB MORTALITY

In 2024, there were 448 (483) deaths from TB—1.2 (1.3) per 100,000. Of these, 437 (465) deaths were due to pulmonary TB and 11 (18) to extrapulmonary TB. TB mortality among men—2.1 (2.2) per 100,000—was 4.3 times higher than among women—0.4 (0.5) per 100,000. The highest mortality rate was recorded in the oldest age group (65+ years)—2.4 (2.5) per 100,000. In 2024, there was one TB-related death among children and none among adolescents. TB accounted for 0.1% of all deaths in Poland and 20.7% of deaths from infectious and parasitic diseases.

BCG VACCINATION

BCG vaccination has been mandatory in Poland since 1955. Revaccination was discontinued in 2006; since then, the vaccine has been administered only once—at birth. In 2025, 219 098 (230 336) newborns received the BCG vaccine, representing 92% of all live births in Poland.

04

SPIS TABEL I RYCIN

Tabela I.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1957– 2025 w wybranych grupach wieku. Współczynniki na 100.000. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups. Poland 1957 – 2025. Rates per 100 000 population.
Tabela II.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela III.	Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela IV.	Zapadalność na gruźlicę płuc w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela V.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed pulmonary cases of tuberculosis and notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela VI.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego. Polska w latach 1995– 2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary sputum smear and culture positive cases and notification rates by age groups. Poland 1995-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela VII.	Zapadalność na gruźlicę pozapłucną w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Extrapulmonary cases and notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.
Rycina 1	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1965-2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis notification rates. Poland 1965 – 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela VIII.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.

Rycina 2	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela IX.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed tuberculosis cases and notifications rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.
Rycina 3	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed tuberculosis cases and notifications rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela X.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by sex, age groups and place of residence. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XI.	Gruźlica w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, płci, wieku i stanu bakteriologicznego. Liczby bezwzględne. Tuberculosis cases by site of disease, bacteriologically status, sex and age groups. Poland 2025 (Numbers).
Tabela XII.	Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, płci, wieku i stanu bakteriologicznego. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis notification rates by site of disease, bacteriologically status, sex and age groups. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XIII.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children (0-14 years old) by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000.
Tabela XIV.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000.
Tabela XV.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg płci, miejsca zamieszkania i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by sex, place of residence and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Rycina 4	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg płci i wieku w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2025. Rates per 100.000 population.

Rycina 5	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania i wieku w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis notification rates by place of residence and age. Poland in 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XVI.	Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1970-2025. Tuberculosis cases by result of bacteriological examination (numbers and percentage). Poland 1970-2025.
Tabela XVII.	Zapadalność na gruźlicę płuc wg stanu bakteriologicznego w Polsce w latach 1972- 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary /respiratory tuberculosis cases and pulmonary tuberculosis notification rates by result of bacteriological examination. Poland 1972-2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XVIII.	Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc wg metod badania bakteriologicznego w Polsce w latach 1972-2025. Pulmonary /respiratory tuberculosis cases by result of bacteriological examination Poland 1972-2025.
Rycina 6	Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc zarejestrowanych w Polsce w 2025 r. Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total cases). Poland 2025.
Tabela XIX.	Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg województw. Tuberculosis cases by result of bacteriological examination and voivodeships (numbers and percentage). Poland 2025.
Tabela XX.	Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc w Polsce w roku 2025 wg województw. Pulmonary tuberculosis by result of bacteriological examination and voivodeships. (numbers and percentage). Poland 2025.
Rycina 7	Struktura bakteriologiczna zachorowań na gruźlicę płuc w Polsce w latach 1970-2025. (do r. 1995 bez MON i MSW) Pulmonary / respiratory tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total PTB cases). Poland 1970-2025.
Rycina 8	Nowe zachorowania i wznovy gruźlicy płuc wg stanu bakteriologicznego w Polsce w 2025 roku. Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total cases). Poland 2025.
Tabela XXI.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases (all forms) and tuberculosis notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXII.	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases (without relapses) and tuberculosis notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Tabela XXIII.	Zapadalność na gruźlicę płuc w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXIV.	Zapadalność na gruźlicę płuc (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary tuberculosis cases (without relapses) and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXV.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXVI.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases (without relapses) and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXVII.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wg metod badania bakteriologicznego i województw w Polsce w roku 2025 Współczynniki na 100.000 ludności. Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases and notification rates by methods of bacteriological examination and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXVIII.	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie z dodatnim wynikiem bakterioskopii w Polsce w 2025 roku wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Cases and notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis with positive sputum smear by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXIX.	Zapadalność na gruźlicę pozapłucną w Polsce w 2025 roku wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Extrapulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXX.	Zachorowania na gruźlicę pozapłucną potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w 2025 roku wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Culture confirmed extrapulmonary tuberculosis by age groups and voivodeships. Poland 2025.
Tabela XXXI.	Zachorowania na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, poprzedniego leczenia i województw. Tuberculosis cases by site of disease, history of previous treatment and voivodeships. Poland 2025.
Tabela XXXII.	Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, poprzedniego leczenia i województw.

Tuberculosis notification rates by site of disease, history of previous treatment and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Tabela XXXIII.	Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian i województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis cases and notification rates (without relapses) by site of disease and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXXIV.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Mapa 1.	Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXXV.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci (bez wznów) w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates (without relapses). Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XXXVI.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg płci - mężczyźni - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 mężczyzn. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and sex. Males. Poland 2025. Rates per 100.000 males.
Tabela XXXVII.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg płci - kobiety - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 kobiet. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and sex. Females. Poland 2025. Rates per 100.000 females.
Tabela XXXVIII.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania - miasto - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and place of residence - urban areas. Poland 2025 Rates per 100.000 population.
Tabela XXXIX.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania - wieś - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and place of residence - rural areas. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XL.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by pulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XLI.	Ranking województw wg zapadalność na gruźlicę płuc (bez wznów) w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by pulmonary tuberculosis notification rates (without relapse). Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Tabela XLII.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie. Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by culture confirmed tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XLIII.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie (bez wznów). Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by culture confirmed tuberculosis notification rates (without relapses). Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XLIV.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie z dodatnim wynikiem bakterioskopii. Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis with positive sputum smear. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Mapa 2	Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w 2025 roku wg województw. Współczynniki na 100.000 ludności. Culture confirmed pulmonary tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland Notification rates of bacteriologically confirmed tuberculosis by voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XLV.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela XLVI.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę pozapłucną w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by extrapulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Rycina 9	Udział chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc wg województw. Polska 2025 rok. Percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases in total PTB notified cases by voivodeships. Poland 2025.
Tabela XLVII.	Ranking województw wg udziału gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wśród chorych na gruźlicę. Polska 2025 rok. Rank-list of voivodeships by percentage of confirmed tuberculosis cases in total registered TB cases. Poland 2025.
Mapa 3	Udział chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc wg województw. Polska 2025 rok. Percentage of bacteriologically culture confirmed pulmonary tuberculosis cases in total registered pulmonary TB cases. Poland 2025.
Tabela XLVIII.	Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc. Polska 2025 rok. Rank-list of voivodeships by percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases in total notified pulmonary cases. Poland 2025.

Tabela XLIX.	Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie z dodatnim wynikiem bakterioskopii wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc. Polska 2025 rok. Rank-list of voivodeships by percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases with positive sputum smear in total notified pulmonary cases. Poland 2025.
Tabela L.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by pediatric tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Tabela LI.	Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci u młodzieży (15-19 lat) w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old). Poland 2025. Rates per 100.000 population.
Rycina 10	Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci ogółem, dzieci i młodocianych w Polsce w latach 1957-2025. Tuberculosis notification rates – children, adolescents and total population. Poland 1957 – 2025. Rates per 100.000.
Tabela LII.	Ranking województw wg udziału (w%) ponownych zachorowań na gruźlicę (wznow) wśród ogółu chorych na gruźlicę zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku. Rank-list of voivodeships by percentage of relapses in total tuberculosis notified cases. Poland 2025.
Tabela LIII.	Gruźlica wśród obywateli cudzoziemskich zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku wg płci, wieku i historii poprzedniego leczenia. Foreign origin tuberculosis cases registered in Poland 2025 by sex, age groups and history of previous treatment.
Tabela LIV.	Gruźlica wśród obywateli cudzoziemskich zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku wg wieku i stanu bakteriologicznego. Foreign origin tuberculosis cases registered in Poland 2025 by age groups and bacteriological status.
Rycina 11	Struktura kliniczna zachorowań na gruźlicę w Polsce w 2025 roku. Clinical profile of tuberculosis cases. Poland 2025.
Tabela LV.	Udział (w %) ostrych postaci gruźlicy w ogólnej zapadalności na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg województw. Percentage of acute severe forms of tuberculosis cases in total tuberculosis cases by voivodeships. Poland 2025.
Tabela LVI.	Chorzy z lekoopornością prątków zarejestrowani wg województw w Polsce na dzień 31 XII 2025 roku (chorobowość wg sprawozdania MZ-13). Antituberculous drug resistant cases by voivodeships. Poland 2025 (prevalance)
Tabela LVII.	Umieralność z powodu gruźlicy wszystkich postaci w Polsce wg grup wieku w latach 1950-2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from tuberculosis (all forms) by age group. Poland 1950- 2024.
Rates per 100.000 population.

Rycina 12	Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce w latach 1970-2024. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from tuberculosis (all forms) in Poland: 1970-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LVIII.	Umieralność z powodu gruźlicy wg lokalizacji zmian, wieku, płci i miejsca zamieszkania w Polsce w 2024 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from pulmonary and extrapulmonary tuberculosis by age groups, sex and place of residence. Poland 2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LIX.	Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce wg płci, miejsca zamieszkania i województw w Polsce w 2024 roku. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from tuberculosis (all forms) by sex, place of residence and voivodeships. Poland 2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LX.	Umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2020-2024. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from tuberculosis (all forms) by voivodeships. Poland 2020-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXI.	Ranking województw wg umieralności z powodu gruźlicy w Polsce w roku 2024. Współczynniki na 100.000 ludności. Rank-list of voivodeships by mortality from tuberculosis (all forms). Poland 2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXII.	Stopień objęcia szczepieniami BCG noworodków w Polsce w roku 2025 wg województw %. BCG vaccination coverage of newborns by voivodeships. Poland 2025.
Tabela LXIII.	Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc wykrytych z objawów chorobowych w Polsce w 2025 roku. Rank-list of voivodeships by percentage of pulmonary TB cases detected by symptoms. Poland 2025.
Rycina 13	Metody wykrywania chorych na gruźlicę układu oddechowego/ płuc w Polsce w latach 1970-2025 . Methods of case finding of respiratory/ pulmonary tuberculosis. Poland 1970-2025.
Tabela LXIV.	Ranking województw wg udziału chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną oraz niepotwierdzoną bakteriologicznie, wykrytych z objawów chorobowych (wśród - odpowiednio – wszystkich chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie lub wszystkich chorych na gruźlicę niepotwierdzoną bakteriologicznie) w Polsce w 2025 roku. Rank-list voivodeships by percentage of pulmonary TB cases detected by symptoms in culture positive and culture negative pulmonary TB cases. Poland 2025.
Tabela LXV.	Umieralność z powodu wybranych przyczyn w Polsce w latach: 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality by selected causes. Poland 2010-2024. Rates per 100.000 population.

Tabela LXVI.	Umieralność z powodu chorób układu oddechowego wg wybranych przyczyn w Polsce w latach 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100 000 ludności. Mortality from selected respiratory diseases – Poland 2010, 2020, 2023, 2024. Rates per 100 000 population.
Tabela LXVII.	Umieralność z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40-J44) i astmy oskrzelowej w Polsce w latach 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100 000 ludności. Mortality from chronic lower respiratory tract diseases (J40-J44) and asthma. Poland 2010, 2020, 2023, 2024. Rates per 100 000 population.
Tabela LXVIII.	Umieralność z powodu zapalenia płuc (J12-J18) w Polsce w latach 1970 – 2024 w wybranych grupach wieku wg płci. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from pneumonia by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXIX.	Umieralność z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40-J44) w Polsce w latach 1970 – 2024 wg płci i wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from chronic lower respiratory tract diseases (J40-J44) by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXX.	Umieralność z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (J44) w Polsce w latach 2000 – 2024 wg płci i wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from chronic obstructive pulmonary disease (J44) by sex and age groups. Poland 2000-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXXI.	Umieralność z powodu astmy (J45-J46) w Polsce w latach 1970 – 2024 wg płci i wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from asthma by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000 population.
Tabela LXXII.	Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Polsce w latach 1960-2023. Registered new cases and mortality from cancers (all sites, respiratory organs and lung). Poland 1960-2023.
Tabela LXXIII.	Zapadalność i umieralność z powodu wszystkich nowotworów złośliwych i nowotworów układu oddechowego w Polsce w latach 1960-2023. Incidence and mortality from cancers (all sites, respiratory organs and lung). Poland 1960-2023.
Tabela LXXIV.	Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych układu oddechowego wg płci w Polsce w latach 1960-2023. Registered new cases and mortality from respiratory organs and lung cancer by sex. Poland 1960-2023. Rates per 100.000 population.
Tabela LXXV.	Zapadalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych układu oddechowego wg płci w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100 000 ludności. Incidence and mortality from respiratory organs and lung cancer by sex. Poland 1960-2023. Rates per 100.000 population.
Tabela LXXVI.	Zapadalność na nowotwory złośliwe płuca (C34) wg płci i wieku w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100.000 ludności.

Lung cancer notification rates by age groups and sex. Poland 1960-2023.
Rates per 100.00 population.

- Tabela LXXVII. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych płuca (C34) wg płci i wieku w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100.000 ludności.
Lung cancer mortality rates by age groups and sex. Poland 1960-2023.
Rates per 100.00 population.
- Tabela LXXVIII. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe (C33-C34) - kobiety 2023r.
Współczynniki na 100.000 ludności.
- Tabela LXXIX. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe (C33-C34) - mężczyźni 2023r.
Współczynniki na 100.000 ludności.
- Tabela LXXX. Ludność Polski wg województw, płci i wieku – stan na 30 VI 2025 rok.
Population by sex, age groups and voivodeships. Poland 30 VI 2025.



05

DEFINICJE

DEFINICJE PRZYPADKÓW GRUŻLICY

Przypadek gruźlicy płuc lub gruźlicy pozapłucnej

Gruźlica płuc oznacza chorobę mięszu płucnego, krtani lub drzewa tchawiczo-oskrzelowego. Choroba zajmująca inne miejsca ciała, włączając izolowaną gruźlicę opłucnej lub izolowaną gruźlicę węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk, jest gruźlicą pozapłucną.

Chory na gruźlicę płuc i jednocześnie na gruźlicę pozapłucną jest określany jako przypadek gruźlicy płuc. Jeśli gruźlica pozapłucna zajmuje jednocześnie kilka narządów, najcięższa postać określa typ chorego np. chory na gruźlicę opon mózgowo- rdzeniowych i opłucnej, stanowi przypadek gruźlicy opon mózgowo- rdzeniowych.

Ciężkie postacie gruźlicy pozapłucnej: zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych, prosówka gruźlicza, zapalenie osierdzia, zapalenie otrzewnej, obustronne lub masywne zapalenie opłucnej, gruźlica kręgosłupa, jelit.

HISTORIA LECZENIA PRZECIWPRAŦKOWEGO

Dane o wcześniejszym leczeniu przeciwpłatkowym są ważne ponieważ umożliwiają wykrywanie rejestrowanie chorych o zwiększonym ryzyku nabytej odporności płatków na leki i podanie odpowiedniego schematu leczenia

1. Nowy przypadek - chory nigdy nie był leczony przeciwpłatkowo lub otrzymywał leczenie przeciwpłatkowe krócej niż 1 miesiąc.
2. Przypadek poprzednio leczony- pozostali chorzy.

KRYTERIA LABORATORYJNE ROZPOZNANIA GRUŻLICY

Przypadek pewny

- Wyhodowanie *M. tuberculosis* z materiału klinicznego.
- Wykrycie materiału genetycznego *M. tuberculosis* w plwocinie oraz dodatni wynik bad. Bakterioskopowego.
- Obecność ziarninaków w bad. histologicznym oraz wykrycie materiału genetycznego *M. tuberculosis*.

Przypadek prawdopodobny

- Dodatni wynik badania bakterioskopowego.
- Wykrycie materiału genetycznego *M. tuberculosis* w materiale klinicznym.
- Ziarniniaki w badaniu histologicznym.

Przypadek możliwy

- Objawy i/lub wynik badania radiologicznego oraz decyzja lekarza, by podać pełne leczenie przeciwpłatkowe.

KATEGORIE OCENY LECZENIA GRUŹLICY WG WHO I ECDC (2021)

Wynik leczenia, charakterystyka chorych:

- Wyleczony: chory na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie na początku leczenia, który zakończył leczenie przeciwpłatkowe zgodnie z zaleceniami krajowymi, z potwierdzeniem odpowiedzi bakteriologicznej ^a i bez cech niepowodzenia leczenia.
- Zakończone leczenie: chory, który zakończył leczenie zgodnie z zaleceniami krajowymi, a wynik leczenia nie spełnia definicji wyleczenia lub niepowodzenia leczenia.
- Niepowodzenie leczenia: chory, u którego schemat leczenia musiał zostać zakończony lub zmieniony na nowy schemat lub nową strategię leczenia ^b.
- Niedostępny dla dalszej obserwacji: chory, który nie rozpoczął leczenia lub przerwał je na ≥ 2 kolejne miesiące.
- Zgon: zgon z jakiegokolwiek przyczyny przed rozpoczęciem leczenia gruźlicy lub w jego trakcie.
- Niepoddany ocenie: chory, u którego nie określono wyniku leczenia ^c.
- Nadal leczony: chory nadal leczony po 12 mies. od rozpoczęcia leczenia (po 24 mies. w przypadku gruźlicy wielolekoopornej), który nie kwalifikuje się do innej kategorii.

a Odpowiedź bakteriologiczna – konwersja bakteriologiczna bez dalszej rewersji bakteriologicznej

1. konwersja bakteriologiczna (dotyczy chorych z bakteriologicznym potwierdzeniem gruźlicy): wyniki ≥ 2 kolejnych posiewów lub rozmazów (do rozmazów można ograniczyć się tylko w gruźlicy wywołanej przez prątki wrażliwe na leki) pobranych w odstępie ≥ 7 dni są ujemne.
2. rewersja bakteriologiczna: wyniki ≥ 2 posiewów lub rozmazów (do rozmazów można ograniczyć się tylko w gruźlicy wywołanej przez prątki wrażliwe na leki) pobranych w odstępie ≥ 7 dni są ponownie dodatnie po wcześniejszej konwersji bakteriologicznej albo gdy nie było wyjściowego potwierdzenia bakteriologicznego gruźlicy.

- b** Przyczyny zmiany leczenia: brak odpowiedzi klinicznej i/lub bakteriologicznej, działania niepożądane leków, dodatkowa oporność na stosowane leki.
- c** Do tej kategorii należą chorzy przeniesieni do innej placówki, których wyniki leczenia są nieznane; wyklucza się osoby „nie dostępne dla dalszej obserwacji”

Źródło: World Health Organization treatment outcome definitions for tuberculosis: 2021 update

06

ZACHOROWANIA I ZAPADALNOŚĆ NA GRUŻLICĘ W 2025 ROKU – TABELLE I RYCINY

Tabela I

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1957 – 2025 w wybranych grupach wieku.
Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups. Poland 1957 – 2025. Rates per 100 000 population.

LATA Years	Ogółem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Ogółem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	WSPÓŁCZYNNIKI NA 100 000 LUDNOŚCI											
1957	82201	16402	5757	37141	19255	3646	290,4	181,0	266,1	370,6	351,6	230,1
1960	85529	16580	4781	37244	22746	4178	289,3	167,6	245,2	365,7	390,3	244,9
1965	57511	4553	3879	23914	18520	6645	182,6	46,6	134,1	221,6	314,5	309,6
1970	42142	1273	2861	18440	13001	6567	128,5	14,3	83,1	158,3	209,6	242,0
1975	26255	535	1695	11844	7753	4428	77,2	6,5	49,5	94,8	116,0	136,5
1980	25807	573	990	11358	8434	4452	72,5	6,6	35,7	84,7	117,9	123,8
1985	21650	314	621	9226	7678	3811	58,2	3,3	24,7	66,3	98,7	108,8
1990	16136	225	421	6682	5818	2990	42,3	2,3	14,8	46,6	77,3	78,0
2000	11477	103	241	3978	4221	2934	29,7	1,4	7,2	28,0	47,2	62,4
2001	10672	124	199	3600	4052	2697	27,6	1,7	6,0	25,4	44,2	56,3
2003	10124	100	184	3045	3968	2827	26,5	1,5	5,8	21,9	41,7	57,6
2004	9493	120	129	2836	3835	2573	24,9	1,9	4,2	20,3	39,5	51,7
2005	9269	99	156	2717	3760	2537	24,3	1,6	5,3	19,4	38,0	50,9
2006	8587	69	156	2529	3655	2178	22,5	1,1	5,5	18,0	36,4	42,8
2007	8614	74	135	2538	3762	2105	22,6	1,2	4,9	18,0	37,0	41,1
2008	8081	76	115	2248	3685	1957	21,2	1,3	4,3	15,9	35,8	38,1
2009	8236	99	131	2250	3704	2052	21,6	1,7	5,1	15,8	35,6	39,9
2010	7509	62	114	2086	3441	1806	19,7	1,1	4,6	14,6	32,8	34,9
2011	8478	111	130	2171	3895	2171	22,2	1,9	5,4	15,2	37,0	41,9
2012	7542	95	166	1996	3404	1881	19,6	1,6	7,3	13,8	32,1	34,8
2013	7250	116	113	1903	3241	1877	18,8	2,0	5,2	13,2	30,8	33,7
2014	6698	70	86	1787	3001	1754	17,4	1,2	4,1	12,4	28,7	30,4
2015	6430	81	83	1752	2909	1605	16,7	1,4	4,1	12,2	28,1	26,9
2016	6444	103	76	1801	2853	1611	16,8	1,8	3,9	12,6	27,8	26,0
2017	5787	68	69	1604	2601	1445	15,1	1,2	3,6	11,3	25,6	22,6
2018	5487	52	60	1473	2494	1408	14,3	0,9	3,3	10,5	24,7	21,3
2019	5321	81	48	1434	2405	1353	13,9	1,4	2,6	10,4	23,9	19,8
2020	3388	39	49	941	1503	856	8,8	0,7	2,7	6,9	15,0	12,1
2021	3704	37	51	1199	1578	839	9,7	0,6	2,8	9,0	15,8	11,7
2022	4314	42	58	1372	1832	1010	11,4	0,7	3,2	10,5	18,5	13,9
2023	4436	51	62	1297	1885	1141	11,8	0,9	3,3	10,2	19,1	15,3
2024	4236	51	68	1293	1772	1052	11,3	0,9	3,5	10,4	17,9	13,8
2025	3829	64	37	1167	1599	962	10,2	1,2	1,8	9,6	16,0	12,3

Tabela II

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce latach 2015 – 2025 w grupach wieku.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups.

Poland 2015– 2025. Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	RAZEM / TOTAL											
2015	6.430	81	83	1.752	2.909	1.605	16,7	1,4	4,1	12,2	28,1	26,9
2016	6.444	103	76	1.801	2.853	1.611	16,8	1,8	3,9	12,6	27,8	26,0
2017	5.787	68	69	1.604	2.601	1.445	15,1	1,2	3,6	11,3	25,6	22,6
2018	5.487	52	60	1.473	2.494	1.408	14,3	0,9	3,3	10,5	24,7	21,3
2019	5.321	81	48	1.434	2.405	1.353	13,9	1,4	2,6	10,4	23,9	19,8
2020	3.388	39	49	941	1.503	856	8,8	0,7	2,7	6,9	15,0	12,1
2021	3.704	37	51	1.199	1.578	839	9,7	0,6	2,8	9,0	15,8	11,7
2022	4.314	42	58	1.372	1.832	1.010	11,4	0,7	3,2	10,5	18,5	13,9
2023	4.436	51	62	1.297	1.885	1.141	11,8	0,9	3,3	10,2	19,1	15,3
2024	4.236	51	68	1293	1772	1052	11,3	0,9	3,5	10,4	17,9	13,8
2025	3.829	64	37	1167	1599	962	10,2	1,2	1,8	9,6	16,0	12,3
NOWE ZACHOROWANIA / NEW CASES												
2015	5.757	81	82	1.578	2.522	1.494	15,0	1,4	4,1	11,0	24,4	25,0
2016	5.713	103	75	1.643	2.412	1.480	14,9	1,8	3,8	11,5	23,5	23,9
2017	5.127	68	68	1.427	2.225	1.339	13,3	1,2	3,6	10,1	21,9	20,9
2018	4.852	52	58	1.316	2.134	1.292	12,6	0,9	3,1	9,4	21,1	19,5
2019	4.717	79	46	1.282	2.062	1.248	12,3	1,3	2,5	9,3	20,5	18,3
2020	2.912	38	49	805	1238	782	7,6	0,6	2,7	5,9	12,4	11,1
2021	3.229	37	48	1065	1340	739	8,5	0,6	2,7	8,0	13,4	10,3
2022	3.787	40	57	1216	1559	915	10,0	0,7	3,2	9,3	15,8	12,6
2023	3.920	49	60	1.157	1.620	1.034	10,4	0,9	3,2	9,1	16,4	13,9
2024	3.737	51	65	1152	1513	956	9,9	0,9	3,3	9,2	15,2	12,5
2025	3374	64	33	1033	1379	865	9,0	1,2	1,6	8,5	13,8	11,1
WZNOWY / RELAPSES												
2015	673	-	1	174	387	111	1,8	-	0,0	1,2	3,7	1,9
2016	731	-	1	158	441	131	1,9	-	0,1	1,1	4,3	2,1
2017	660	-	1	177	376	106	1,7	-	0,1	1,3	3,7	1,7
2018	635	-	2	157	360	116	1,7	-	0,1	1,1	3,6	1,8
2019	604	2	2	152	343	105	1,6	0,0	0,1	1,1	3,4	1,5
2020	476	1	-	136	265	74	1,2	0,0	-	1,0	2,6	1,0
2021	475	-	3	134	238	100	1,2	-	0,2	1,0	2,4	1,4
2022	527	2	1	156	273	95	1,4	0,0	0,1	1,2	2,8	1,3
2023	516	2	2	140	265	107	1,4	0,0	0,1	1,1	2,7	1,4
2024	499	-	3	141	259	96	1,3	-	0,2	1,1	2,6	1,3
2025	455	-	4	134	220	97	1,2	-	0,2	1,1	2,2	1,2

Tabela III

Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku. Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	RAZEM / TOTAL											
2015	4.630	18	45	1.386	2.126	1.055	12,0	0,3	2,2	9,6	20,5	17,7
2016	4.619	15	50	1.422	2.077	1.055	12,0	0,3	2,6	10,0	20,2	17,1
2017	4.179	15	50	1.255	1.910	949	10,9	0,3	2,6	8,9	18,8	14,8
2018	4.075	21	54	1.194	1.892	914	10,6	0,4	2,9	8,5	18,7	13,8
2019	4.054	28	39	1.183	1.888	916	10,6	0,5	2,2	8,6	18,8	13,4
2020	2.655	8	33	807	1.210	597	6,9	0,1	1,8	5,9	12,1	8,5
2021	3.061	10	40	1.038	1.328	645	8,0	0,2	2,2	7,8	13,3	9,0
2022	3.488	15	43	1.184	1.518	728	9,2	0,3	2,4	9,1	15,4	10,0
2023	3.554	11	48	1.122	1.548	825	9,4	0,2	2,6	8,8	15,7	11,1
2024	3.484	14	58	1128	1470	814	9,3	0,3	3,0	9,0	14,8	10,7
2025	3.180	24	21	1025	1374	736	8,5	0,4	1,0	8,4	13,7	9,4
NOWE ZACHOROWANIA / NEW CASES												
2015	4.131	18	44	1.242	1.839	988	10,7	0,3	2,2	8,6	17,8	16,6
2016	4.106	15	49	1.291	1.765	986	10,7	0,3	2,5	9,0	17,2	15,9
2017	3.721	15	50	1.119	1.652	885	9,7	0,3	2,6	7,9	16,2	13,8
2018	3.587	21	52	1.065	1.616	833	9,3	0,4	2,8	7,6	16,0	12,6
2019	3.590	27	38	1.051	1.628	846	9,4	0,5	2,1	7,6	16,2	12,4
2020	2.268	8	33	691	993	543	5,9	0,1	1,8	5,1	9,9	7,7
2021	2.670	10	37	918	1132	573	7,0	0,2	2,1	6,9	11,4	8,0
2022	3.071	14	42	1051	1303	661	8,1	0,2	2,3	8,1	13,2	9,1
2023	3.145	9	47	1.002	1.338	749	8,3	0,2	2,5	7,9	13,5	10,1
2024	3.097	14	55	1008	1268	752	8,2	0,3	2,8	8,1	12,8	9,8
2025	2825	24	17	907	1206	671	7,6	0,4	0,8	7,4	12,1	8,6
WZNOWY / RELAPSES												
2015	499	-	1	144	287	67	1,3	-	0,0	1,0	2,8	1,1
2016	513	-	1	131	312	69	1,3	-	0,1	0,9	3,0	1,1
2017	458	-	-	136	258	64	1,2	-	-	1,0	2,5	1,0
2018	488	-	2	129	276	81	1,3	-	0,1	0,9	2,7	1,2
2019	464	1	1	132	260	70	1,2	0,0	0,1	1,0	2,6	1,0
2020	387	-	-	116	217	54	1,0	-	-	0,9	2,2	0,8
2021	391	-	3	120	196	72	1,0	-	0,2	0,9	2,0	1,0
2022	417	1	1	133	215	67	1,1	0,0	0,1	1,0	2,2	0,9
2023	409	2	1	120	210	76	1,1	0,0	0,1	0,9	2,1	1,0
2024	387	-	3	120	202	62	1,0	-	0,2	1,0	2,0	0,8
2025	355	-	4	118	168	65	0,9	-	0,2	1,0	1,7	0,8

Tabela IV

Zapadalność na gruźlicę płuc w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Pulmonary tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	RAZEM / TOTAL											
2015	6.078	51	70	1.650	2.812	1.495	15,8	0,9	3,5	11,5	27,2	25,0
2016	6.116	76	68	1.733	2.747	1.492	15,9	1,3	3,5	12,1	26,8	24,1
2017	5.531	45	63	1.544	2.526	1.353	14,4	0,8	3,3	10,9	24,8	21,1
2018	5.244	35	58	1.418	2.410	1.323	13,7	0,6	3,1	10,1	23,9	20,0
2019	5.075	61	42	1.384	2.323	1.265	13,2	1,0	2,3	10,0	23,1	18,5
2020	3.237	37	44	899	1.451	806	8,4	0,6	2,4	6,6	14,5	11,4
2021	3.553	31	46	1.154	1.534	788	9,3	0,5	2,6	8,6	15,4	11,0
2022	4.148	35	51	1.313	1.798	951	11,0	0,6	2,8	10,1	18,2	13,1
2023	4.265	44	52	1.243	1.844	1.082	11,3	0,8	2,8	9,7	18,6	14,5
2024	4.093	47	63	1.233	1.736	1014	10,9	0,8	3,2	9,9	17,5	13,3
2025	3.681	54	35	1.112	1.561	919	9,8	1,0	1,7	9,1	15,6	11,8
NOWE ZACHOROWANIA / NEW CASES												
2015	5.416	51	69	1.479	2.429	1.388	14,1	0,9	3,4	10,3	23,5	23,3
2016	5.407	76	67	1.582	2.314	1.368	14,1	1,3	3,4	11,1	22,6	22,1
2017	4.881	45	62	1.368	2.155	1.251	12,7	0,8	3,3	9,7	21,2	19,5
2018	4.616	35	56	1.263	2.053	1.209	12,0	0,6	3,0	9,0	20,3	18,3
2019	4.481	59	40	1.235	1.983	1.164	11,7	1,0	2,2	8,9	19,7	17,0
2020	2.770	36	44	768	1.187	735	7,2	0,6	2,4	5,6	11,9	10,4
2021	3.084	31	43	1.020	1.298	692	8,1	0,5	2,4	7,6	13,0	9,6
2022	3.627	34	50	1.161	1.526	856	9,6	0,6	2,8	8,9	15,4	11,8
2023	3.753	42	50	1.104	1.581	976	10,0	0,7	2,7	8,7	16,0	13,1
2024	3.600	47	60	1.095	1.477	921	9,6	0,8	3,1	8,8	14,9	12,1
2025	3.232	54	31	981	1.344	822	8,6	1,0	1,5	8,0	13,4	10,6
WZNOWY / RELAPSES												
2015	662	-	1	171	383	107	1,7	-	0,1	1,2	3,7	1,8
2016	709	-	1	151	433	124	1,8	-	0,1	1,1	4,2	2,0
2017	650	-	1	176	371	102	1,7	-	0,1	1,2	3,6	1,6
2018	628	-	2	155	357	114	1,6	-	0,1	1,1	3,5	1,7
2019	594	2	2	149	340	101	1,5	0,0	0,1	1,1	3,4	1,5
2020	467	1	-	131	264	71	1,2	0,0	-	1,0	2,6	1,0
2021	469	-	3	134	236	96	1,2	-	0,2	1,0	2,4	1,3
2022	521	1	1	152	272	95	1,4	0,0	0,0	1,2	2,8	1,3
2023	512	2	2	139	263	106	1,4	0,0	0,1	1,1	2,7	1,4
2024	493	-	3	138	259	93	1,3	-	0,2	1,1	2,6	1,2
2025	449	-	4	131	217	97	1,2	0,2	1,1	2,2	1,2	1,2

Tabela V

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed pulmonary cases of tuberculosis and notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025. Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku. Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	RAZEM / TOTAL											
2015	4.472	12	41	1.333	2.082	1.004	11,6	0,2	2,0	9,3	20,1	16,8
2016	4.475	10	45	1.387	2.039	994	11,6	0,2	2,3	9,7	19,9	16,1
2017	4.057	10	47	1.221	1.883	896	10,6	0,2	2,5	8,6	18,5	14,0
2018	3.935	14	52	1.158	1.852	859	10,2	0,2	2,8	8,3	18,3	13,0
2019	3.926	21	34	1.149	1.853	869	10,2	0,4	1,9	8,3	18,4	12,7
2020	2.573	7	30	779	1181	576	6,7	0,1	1,7	5,7	11,8	8,2
2021	2.970	8	37	1012	1296	617	7,8	0,1	2,1	7,6	13,0	8,6
2022	3.396	12	38	1147	1498	701	9,0	0,2	2,1	8,8	15,2	9,7
2023	3.460	10	40	1.083	1.529	798	9,2	0,2	2,1	8,5	15,5	10,7
2024	3.391	13	55	1085	1451	787	9,0	0,2	2,8	8,7	14,6	10,3
2025	3.085	21	20	987	1349	708	8,2	0,4	1,0	8,1	13,5	9,1
NOWE ZACHORWANIA / NEW CASES												
2015	3.978	12	40	1.190	1.797	939	10,3	0,2	2,0	8,3	17,4	15,7
2016	3.973	10	44	1.260	1.730	929	10,3	0,2	2,3	8,8	16,9	15,0
2017	3.603	10	47	1.086	1.625	835	9,4	0,2	2,5	7,7	16,0	13,0
2018	3.451	14	50	1.030	1.577	780	9,0	0,2	2,7	7,4	15,6	11,8
2019	3.466	20	33	1.018	1.594	801	9,0	0,3	1,8	7,4	15,9	11,7
2020	2.192	7	30	666	965	524	5,7	0,1	1,7	4,9	9,6	7,4
2021	2.582	8	34	892	1102	546	6,8	0,1	1,9	6,7	11,1	7,6
2022	2.983	12	37	1016	1284	634	7,9	0,2	2,1	7,8	13,0	8,7
2023	3.054	8	39	964	1.320	723	8,1	0,1	2,1	7,6	13,3	9,7
2024	3.008	13	52	968	1249	726	8,0	0,2	2,7	7,8	12,6	9,5
2025	2.733	21	16	871	1182	643	7,3	0,4	0,8	7,1	11,8	8,3
WZNOWY / RELAPSES												
2015	494	-	1	143	285	65	1,3	-	0,0	1,0	2,8	1,1
2016	502	-	1	127	309	65	1,3	-	0,1	0,9	3,0	1,1
2017	454	-	-	135	258	61	1,2	-	-	1,0	2,5	1,0
2018	484	-	2	128	275	79	1,3	-	0,1	0,9	2,7	1,2
2019	460	1	1	131	259	68	1,2	0,0	0,1	0,9	2,6	1,0
2020	381	-	-	113	216	52	1,0	-	-	0,8	2,2	0,7
2021	388	-	3	120	194	71	1,0	-	0,2	0,9	1,9	1,0
2022	413	-	1	131	214	67	1,1	-	0,1	1,0	2,2	0,9
2023	406	2	1	119	209	75	1,1	0,0	0,1	0,9	2,1	1,0
2024	383	-	3	117	202	61	1,0	-	0,2	0,9	2,0	0,8
2025	352	-	4	116	167	65	0,9	-	0,2	1,0	1,7	0,8

Tabela VI

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego. Polska w latach 1995 – 2025 w grupach wieku. Współczynniki na 100.000 ludności. Pulmonary sputum smear and culture positive cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland 1995-2025. Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w wybranych grupach wieku Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
1995	4.273	6	77	1.910	1.453	827	11,1	0,1	2,4	13,3	18,2	19,4
1997	4.054	10	60	1.747	1.424	813	10,5	0,1	1,8	12,2	17,1	18,2
1998	4.049	9	44	1.728	1.430	838	10,5	0,1	1,3	12,1	16,8	18,4
1999	3.711	10	69	1.471	1.434	727	9,6	0,1	2,1	10,3	16,4	15,7
2000	3.713	2	54	1.525	1.321	811	9,6	0,0	1,6	10,7	14,8	17,3
2003	3.501	5	66	1.235	1.391	804	9,2	0,1	2,1	8,9	14,6	16,4
2004	3.219	3	37	1.166	1.355	658	8,4	0,0	1,2	8,4	13,9	13,9
2005	3.253	6	53	1.115	1.361	718	8,5	0,1	1,8	8,0	13,8	14,4
2006	3.307	2	44	1.125	1.463	673	8,7	0,0	1,6	8,0	14,6	11,3
2007	3.291	4	30	1.026	1.481	640	8,6	0,1	1,1	7,3	14,6	12,5
2008	3.047	9	36	981	1477	544	8,0	0,2	1,4	6,9	14,4	10,6
2009	3.063	6	36	974	1.458	589	8,0	0,1	1,4	6,9	14,0	11,4
2010	2.803	5	36	895	1.351	516	7,3	0,1	1,5	6,3	12,9	10,0
2011	2.916	6	36	878	1.434	562	7,6	0,1	1,5	6,1	13,6	10,8
2012	2.778	2	45	901	1.307	523	7,2	0,0	2,0	6,2	12,3	9,7
2013	2.859	5	31	889	1.368	566	7,4	0,1	1,4	6,2	13,0	10,2
2014	2.800	6	34	874	1.345	541	7,3	0,1	1,6	6,1	12,9	9,4
2015	2.714	4	23	826	1.375	486	7,1	0,1	1,1	5,7	13,3	8,1
2016	2.612	2	23	841	1.276	470	6,8	0,0	1,2	5,9	12,4	7,6
2017	2.472	3	26	768	1.243	432	6,4	0,1	1,4	5,4	12,2	6,7
2018	2.324	2	36	690	1.166	430	6,1	0,0	2,0	4,9	11,5	6,5
2019	2.565	6	18	778	1.280	483	6,7	0,1	1,0	5,6	12,7	7,1
2020	1.771	1	20	562	847	341	4,6	0,0	1,1	4,1	8,5	4,8
2021	2.085	2	22	739	945	377	5,5	0,0	1,2	5,5	9,5	5,3
2022	2.249	2	25	772	1.032	418	5,9	0,0	1,4	5,9	10,4	5,8
2023	2.221	4	18	725	1.024	450	5,9	0,1	1,0	5,7	10,4	6,0
2024	2.269	3	32	740	1.056	438	6,0	0,1	1,6	5,9	10,6	5,7
2025	2.022	4	13	661	952	392	5,4	0,1	0,6	5,4	9,5	5,0

Tabela VII

Zapadalność na gruźlicę pozapłucną w Polsce w latach 2015-2025 w grupach wieku.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Extrapulmonary cases and notification rates by case status and age groups. Poland 2015-2025 . Rates per 100.000 population.

Rok Year	Liczba zachorowań w grupach wieku Number of cases in age groups (years)						Współczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku. Rate per 100.000 population					
	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
	RAZEM / TOTAL											
2015	352	30	13	102	97	110	0,9	0,5	0,6	0,7	0,9	1,8
2016	328	27	8	68	106	119	0,9	0,5	0,4	0,5	1,0	1,9
2017	256	23	6	60	75	92	0,7	0,4	0,3	0,4	0,7	1,4
2018	243	17	2	55	84	85	0,6	0,3	0,1	0,4	0,8	1,3
2019	246	20	6	50	82	88	0,6	0,3	0,3	0,4	0,8	1,3
2020	151	2	5	42	52	50	0,4	0,0	0,3	0,3	0,5	0,7
2021	151	6	5	45	44	51	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,7
2022	166	7	7	59	34	59	0,4	0,1	0,4	0,5	0,3	0,8
2023	171	7	10	54	41	59	0,5	0,1	0,5	0,4	0,4	0,8
2024	143	4	5	60	36	38	0,4	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5
2025	148	10	2	55	38	43	0,4	0,2	0,1	0,5	0,4	0,6
NOWE ZACHOROWANIA / NEW CASES												
2015	341	30	13	99	93	106	0,9	0,5	0,6	0,7	0,9	1,8
2016	306	27	8	61	98	112	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	1,8
2017	246	23	6	59	70	88	0,6	0,4	0,3	0,4	0,7	1,4
2018	236	17	2	53	81	83	0,6	0,3	0,1	0,4	0,8	1,3
2019	236	20	6	47	79	84	0,6	0,3	0,3	0,3	0,8	1,2
2020	142	2	5	37	51	47	0,4	0,0	0,3	0,3	0,5	0,7
2021	145	6	5	45	42	47	0,4	0,1	0,3	0,3	0,4	0,7
2022	160	6	7	55	33	59	0,4	0,1	0,4	0,4	0,3	0,8
2023	167	7	10	53	39	58	0,4	0,1	0,5	0,4	0,4	0,8
2024	137	4	5	57	36	35	0,4	0,1	0,3	0,5	0,4	0,5
2025	142	10	2	52	35	43	0,4	0,2	0,1	0,4	0,3	0,6
WZNOWY / RELAPSES												
2015	11	-	-	3	4	4	0,0	-	-	0,0	0,0	0,1
2016	22	-	-	7	8	7	0,1	-	-	0,0	0,1	0,1
2017	10	-	-	1	5	4	0,0	-	-	0,0	0,0	0,1
2018	7	-	-	2	3	2	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
2019	10	-	-	3	3	4	0,0	-	-	0,0	0,0	0,1
2020	9	-	-	5	1	3	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
2021	6	-	-	-	2	4	0,0	-	-	-	0,0	0,1
2022	6	1	-	4	1	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
2023	4	-	-	1	2	1	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0
2024	6	-	-	3	-	3	0,0	-	-	0,0	-	0,0
2025	6	-	-	3	3	-	0,0	-	-	0,0	0,0	-

Rycina 1

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1965-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

TUBERCULOSIS NOTIFICATION RATES. POLAND 1965 – 2025. RATES PER 100.000 POPULATION.




Tabela VIII

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodships	Liczby bezwzględne/ Numbers					Współczynniki/ Rates				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
POLSKA	3 704	4 314	4 436	4 236	3 829	9,7	11,4	11,8	11,3	10,2
1. Dolnośląskie	279	410	323	386	315	9,7	14,2	11,2	13,4	11,0
2. Kujawsko-pomorskie	222	236	241	194	206	10,8	11,7	12,0	9,7	10,4
3. Lubelskie	249	293	326	328	270	11,9	14,4	16,2	16,4	13,6
4. Lubuskie	58	98	68	120	134	5,8	10,0	7,0	12,3	13,9
5. Łódzkie	246	317	341	288	259	10,1	13,3	14,4	12,2	11,1
6. Małopolskie	290	345	363	307	364	8,5	10,1	10,6	9,0	10,6
7. Mazowieckie	668	655	705	601	491	12,3	11,9	12,8	10,9	8,9
8. Opolskie	93	91	112	93	78	9,6	9,6	11,9	10,0	8,4
9. Podkarpackie	192	203	210	211	186	9,1	9,8	10,1	10,2	9,0
10. Podlaskie	63	68	72	85	85	5,4	5,9	6,3	7,5	7,5
11. Pomorskie	220	240	278	257	250	9,4	10,2	11,8	10,9	10,6
12. Śląskie	565	703	682	718	618	12,6	16,1	15,7	16,7	14,5
13. Świętokrzyskie	137	147	182	137	130	11,2	12,4	15,5	11,8	11,3
14. Warmińsko-mazurskie	82	86	91	106	90	5,8	6,3	6,7	7,8	6,7
15. Wielkopolskie	199	232	248	204	177	5,7	6,6	7,1	5,9	5,1
16. Zachodniopomorskie	141	190	194	201	176	8,4	11,5	11,9	12,4	10,9

Rycina 2

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.




Tabela IX

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed tuberculosis cases and notifications rates by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodships	Liczby bezwzględne/ Numbers					Współczynniki/ Rates				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
POLSKA	3061	3488	3554	3484	3180	8,0	9,2	9,4	9,3	8,5
1. Dolnośląskie	256	382	300	363	275	8,9	13,2	10,4	12,6	9,6
2. Kujawsko-pomorskie	201	209	228	186	185	9,8	10,4	11,4	9,3	9,4
3. Lubelskie	193	208	240	226	189	9,3	10,2	11,9	11,3	9,5
4. Lubuskie	47	72	46	102	99	4,7	7,3	4,7	10,5	10,2
5. Łódzkie	158	193	211	188	180	6,5	8,1	8,9	8,0	7,7
6. Małopolskie	260	299	288	259	312	7,6	8,7	8,4	7,6	9,1
7. Mazowieckie	494	515	555	523	454	9,1	9,3	10,1	9,5	8,2
8. Opolskie	78	83	89	80	54	8,0	8,8	9,5	8,6	5,8
9. Podkarpackie	145	162	152	171	147	6,9	7,8	7,3	8,3	7,1
10. Podlaskie	56	64	61	77	73	4,8	5,6	5,3	6,8	6,5
11. Pomorskie	193	200	241	229	225	8,2	8,5	10,2	9,7	9,5
12. Śląskie	473	539	522	522	482	10,6	12,4	12,0	12,1	11,3
13. Świętokrzyskie	117	112	154	106	112	9,6	9,5	13,1	9,1	9,7
14. Warmińsko-mazurskie	68	74	75	82	75	4,8	5,4	5,5	6,1	5,6
15. Wielkopolskie	194	212	224	188	167	5,6	6,1	6,4	5,4	4,8
16. Zachodniopomorskie	128	164	168	182	151	7,6	10,0	10,3	11,2	9,3

Rycina 3

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.




Tabela X

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg wieku, płci i miejsca zamieszkania w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by sex, age groups and place of residence. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

PŁEĆ / MIEJSCE ZAMIESZKANIA		GRUPY WIEKU / AGE GROUPS															RAZEM Total
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70+	
POLSKA Poland	L.N	35	12	17	37	79	171	204	301	412	378	416	398	407	340	622	3829
	WSP.R	2,4	0,6	0,9	1,8	4,5	8,7	8,4	10,6	12,9	12,5	16,1	18,2	18,3	13,7	11,7	10,2
MĘŻCZYŹNI Males	L.N	21	6	8	22	46	114	141	224	333	308	345	342	337	260	381	2888
	WSP.R	2,8	0,6	0,8	2,1	5,1	11,4	11,4	15,6	20,7	20,4	26,8	32,0	32,0	23,2	18,7	16,0
KOBIECY Females	L.N	14	6	9	15	33	57	63	77	79	70	71	56	70	80	241	941
	WSP.R	2,0	0,6	0,9	1,5	3,8	5,9	5,3	5,5	5,0	4,7	5,5	5,0	6,0	5,9	7,3	4,9
MIASTO URBAN AREAS	L.N	23	6	10	26	56	123	140	219	268	257	264	262	258	223	383	2518
	WSP.R	2,8	0,6	0,9	2,3	6,1	10,8	9,5	12,8	13,9	14,2	17,5	21,0	19,9	14,4	10,9	11,3
WIEŚ RURAL AREAS	L.N	12	6	7	11	23	48	64	82	144	121	152	136	149	117	239	1311
	WSP.R	1,9	0,7	0,8	1,2	2,8	5,8	6,7	7,3	11,4	10,1	14,1	14,6	16,2	12,5	13,4	8,6

Tabela XI

Gruźlica w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, płci, wieku i stanu bakteriologicznego. Liczby bezwzględne.

Tuberculosis cases by site of disease, bacteriologically status, sex and age groups. Poland 2025 (Numbers).

Wiek Age	Wszystkie postacie gruźlicy TB all forms			Gruźlica płuc Pulmonary TB						Gruźlica pozapłucna Extrapulmonary TB					
				Ogółem Total		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases		Niepotwierdzone Not confirmed		Ogółem Total		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases		Niepotwierdzone Not confirmed	
	Ogółem Total	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiet y Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężcz yźni Male	Kobiety Female
0-4	35	21	14	16	12	2	8	14	4	5	2	-	1	5	1
5-14	29	14	15	13	13	3	8	10	5	1	2	1	1	-	1
15-19	37	22	15	22	13	9	11	13	2	0	2	-	1	-	1
20-24	79	46	33	41	31	33	27	8	4	5	2	4	2	1	-
25-34	375	255	120	243	111	218	96	25	15	12	9	8	5	4	4
35-44	713	557	156	534	152	482	131	52	21	23	4	18	1	5	3
45-54	794	653	141	636	135	565	115	71	20	17	6	14	4	3	2
55-64	805	679	126	670	120	578	91	92	29	9	6	5	2	4	4
65+	962	641	321	619	300	490	218	129	82	22	21	14	14	8	7
Razem	3829	2888	941	2794	887	2380	705	414	182	94	54	64	31	30	23
Ogółem	3829			3681		3085		596		148		95		53	

Tabela XII

Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, płci, wieku i stanu bakteriologicznego. Współczynniki na 100.000 ludności.
Tuberculosis notification rates by site of disease, bacteriologically status, sex and age groups. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Wiek Age	Wszystkie postacie gruźlicy TB all forms			Gruźlica płuc Pulmonary TB						Gruźlica pozapłucna Extrapulmonary TB					
				Ogółem Total		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases		Niepotwierdzone Not confirmed		Ogółem Total		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases		Niepotwierdzone Not confirmed	
	Ogółem Total	Mężczy źni Male	Kobiet y Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female	Mężczy źni Male	Kobiety Female
0-4	2,4	2,8	2,0	2,1	1,7	0,3	1,1	1,9	0,6	0,7	0,3	-	0,1	0,7	0,1
5-14	0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,1	0,4	0,5	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	-	0,1
15-19	1,8	2,1	1,5	2,1	1,3	0,9	1,1	1,3	0,2	0,0	0,2	-	0,1	-	0,1
20-24	4,5	5,1	3,8	4,6	3,6	3,7	3,1	0,9	0,5	0,6	0,2	0,4	0,2	0,1	-
25-34	8,5	11,4	5,5	10,9	5,1	9,8	4,4	1,1	0,7	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2
35-44	11,8	18,3	5,2	17,5	5,1	15,8	4,4	1,7	0,7	0,8	0,1	0,6	0,0	0,2	0,1
45-54	14,2	23,3	5,0	22,7	4,8	20,2	4,1	2,5	0,7	0,6	0,2	0,5	0,1	0,1	0,1
55-64	18,3	32,0	5,5	31,6	5,3	27,2	4,0	4,3	1,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
65+	12,3	20,3	6,9	19,6	6,5	15,5	4,7	4,1	1,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2
Razem	10,2	16,0	4,9	15,5	4,6	13,2	3,6	2,3	0,9	0,5	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1
Ogółem	10,2			9,8		8,2		1,6		0,4		0,3		0,1	

Tabela XIII

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce wg województw w latach 2021-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children (0-14 years old) by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers					Współczynniki / Rates				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
P O L S K A	37	42	51	51	64	0,6	0,7	0,9	0,9	1,2
1. Dolnośląskie	2	4	2	1	1	0,5	0,9	0,5	0,2	0,3
2. Kujawsko-pomorskie	2	9	1	3	4	0,6	2,9	0,3	1,0	1,4
3. Lubelskie	-	4	7	3	3	-	1,3	2,4	1,0	1,1
4. Lubuskie	-	-	2	1	8	-	-	1,4	0,7	5,9
5. Łódzkie	-	1	2	4	3	-	0,3	0,6	1,2	0,9
6. Małopolskie	5	1	3	-	12	0,9	0,2	0,5	-	2,3
7. Mazowieckie	17	8	9	13	7	1,9	0,9	1,0	1,5	0,8
8. Opolskie	1	-	-	-	1	0,8	-	-	-	0,8
9. Podkarpackie	2	-	4	4	1	0,6	-	1,2	1,3	0,3
10. Podlaskie	1	1	1	-	-	0,6	0,6	0,6	-	-
11. Pomorskie	3	9	10	8	13	0,8	2,3	2,6	2,1	3,5
12. Śląskie	4	3	3	10	2	0,6	0,5	0,5	1,7	0,3
13. Świętokrzyskie	-	-	-	3	4	-	-	-	1,9	2,7
14. Warmińsko-mazurskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1,1
15. Wielkopolskie	-	1	2	-	2	-	0,2	0,4	-	0,4
16. Zachodniopomorskie	-	1	5	1	1	-	0,4	2,2	0,4	0,5

Tabela XIV

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce wg województw w latach 2021- 2025 Współczynniki na 100.000.

Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodeships. Poland 2021-2025. Rates per 100.000.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers					Współczynniki / Rates				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
P O L S K A	51	58	62	68	37	2,8	3,2	3,3	3,5	1,8
1. Dolnośląskie	5	7	4	3	3	4	5,6	3,0	2,2	2,1
2. Kujawsko-pomorskie	5	1	1	8	4	5	1	1,0	7,5	3,6
3. Lubelskie	6	5	8	7	-	5,9	4,9	7,7	6,6	-
4. Lubuskie	1	-	-	3	1	2,1	-	-	5,7	1,8
5. Łódzkie	4	1	9	7	3	3,7	0,9	8,0	6,0	2,5
6. Małopolskie	3	2	2	1	4	1,8	1,2	1,2	0,6	2,2
7. Mazowieckie	7	10	10	6	3	2,7	3,8	3,6	2,1	1,0
8. Opolskie	-	2	-	1	3	-	4,8	-	2,3	6,6
9. Podkarpackie	1	2	1	1	-	0,9	1,9	0,9	0,9	-
10. Podlaskie	2	1	-	-	-	3,6	1,8	-	-	-
11. Pomorskie	2	5	8	7	4	1,7	4,3	6,5	5,4	3,0
12. Śląskie	6	10	7	6	7	3,1	5,1	3,5	2,8	3,2
13. Świętokrzyskie	-	3	1	2	1	-	5,4	1,8	3,4	1,6
14. Warmińsko-mazurskie	-	-	2	1	1	-	-	2,8	1,3	1,3
15. Wielkopolskie	9	4	4	8	2	5,2	2,3	2,2	4,2	1,0
16. Zachodniopomorskie	-	5	5	7	1	-	6,5	6,3	8,4	1,2

Tabela XV

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg płci, miejsca zamieszkania i województw. Współczynniki na 100.000.


Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by sex, place of residence and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers					Współczynniki / Rates				
	Ogółem Total	Mężczyźni Male	Kobiety Female	Miasto Urban areas	Wieś Rural areas	Ogółem Total	Mężczyźni Male	Kobiety Female	Miasto Urban areas	Wieś Rural areas
Polska	3829	2888	941	2518	1311	10,2	16,0	4,9	11,3	8,6
1. Dolnośląskie	315	246	69	229	86	11,0	17,9	4,6	11,9	9,1
2. Kujawsko-pomorskie	206	162	44	136	70	10,4	16,9	4,3	11,9	8,4
3. Lubelskie	270	199	71	119	151	13,6	20,7	6,9	12,9	14,2
4. Lubuskie	134	90	44	102	32	13,9	19,2	8,8	16,5	9,2
5. Łódzkie	259	179	80	157	102	11,1	16,1	6,5	10,9	11,4
6. Małopolskie	364	268	96	191	173	10,6	16,1	5,4	11,7	9,7
7. Mazowieckie	491	385	106	345	146	8,9	14,6	3,7	9,7	7,5
8. Opolskie	78	61	17	48	30	8,4	13,6	3,5	9,8	6,8
9. Podkarpackie	186	146	40	78	108	9,0	14,5	3,8	9,2	8,9
10. Podlaskie	85	69	16	53	32	7,5	12,6	2,8	7,7	7,2
11. Pomorskie	250	194	56	170	80	10,6	16,9	4,6	11,6	9,0
12. Śląskie	618	484	134	536	82	14,5	23,6	6,0	16,6	7,9
13. Świętokrzyskie	130	83	47	57	73	11,3	14,8	7,9	11,0	11,5
14. Warmińsko-mazurskie	90	60	30	59	31	6,7	9,2	4,4	7,5	5,6
15. Wielkopolskie	177	130	47	106	71	5,1	7,7	2,6	5,8	4,3
16. Zachodniopomorskie	176	132	44	132	44	10,9	16,8	5,3	12,0	8,5

Rycina 4

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg płci i wieku w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2025. Rates per 100.000 population.



Rycina 5

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania i wieku w Polsce w 2025 roku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2025. Rates per 100.000 population.




Tabela XVI

Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w latach 1970-2025.

Tuberculosis cases by result of bacteriological examination (numbers and percentage).

Poland 1970-2025.

Rok Year	Wszystkie przypadki		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed				Niepotwierdzone bakteriologicznie Not confirmed	
			Bakterioskopia dodatnia / smear positive		Bakterioskopia ujemna lub nieznana/ smear negative, unknown			
	Total cases							
	liczba (N)	%	liczba (N)	%	liczba (N)	%	liczba (N)	%
1970	41.536	100,0	.	.	.	.	22.541	54,3
1972	35.205	100,0	9.371	26,6	8.270	23,5	17.564	49,9
1975	25.924	100,0	9.535	36,8	7.067	27,2	9.322	36,0
1980	25.451	100,0	7.802	30,7	6.556	25,7	11.093	43,6
1990	15.961	100,0	4.593	28,8	3.843	24,1	7.525	47,1
1991	16.324	100,0	4.922	30,2	3.929	24,0	7.473	45,8
1993	16.672	100,0	4.973	29,8	4.004	24,0	7.695	46,2
1994	16.466	100,0	4.663	28,3	3.834	23,3	7.969	48,4
1995	15.771	100,0	4.318	27,4	3.825	24,2	7.628	48,4
1996	15.358	100,0	4.199	27,3	3.888	25,3	7.271	47,4
1997	13.967	100,0	4.117	29,5	3.367	24,1	6.483	46,4
1998	13.302	100,0	4.090	30,7	3.411	25,7	5.801	43,6
1999	12.179	100,0	3.765	30,9	2.944	24,2	5.470	44,9
2000	11.477	100,0	3.770	32,9	2.748	23,9	4.959	43,2
2001	10.672	100,0	3.699	34,7	2.384	22,3	4.589	43,0
2002	10.475	100,0	3.511	33,5	2.385	22,8	4.579	43,7
2003	10.124	100,0	3.573	35,3	2.257	22,3	4.294	42,4
2004	9.493	100,0	3.264	34,4	2.044	21,5	4.185	44,1
2005	9.296	100,0	3.253	35,1	2.146	23,2	3.870	41,8
2006	8.587	100,0	3.307	38,5	1.922	22,4	3.358	39,1
2007	8.614	100,0	3.291	38,2	2.119	24,6	3.204	37,2
2008	8.081	100,0	3.047	37,7	2.047	25,3	2.987	37,0
2009	8.236	100,0	3.063	37,2	2.160	26,2	3.013	36,6
2010	7.509	100,0	2.803	37,3	1.953	26,0	2.753	36,7
2011	8.478	100,0	2.916	34,4	2.665	31,4	2.897	34,2
2012	7.542	100,0	2.778	36,8	2.292	30,4	2.472	32,8
2013	7.250	100,0	2.859	39,4	1.966	27,1	2.425	33,4
2014	6.698	100,0	2.800	41,8	1.981	29,6	1.917	28,6
2015	6.430	100,0	2.714	42,2	1.916	29,8	1.800	28,0
2016	6.444	100,0	2.612	40,5	2.007	31,1	1.825	28,3
2017	5.787	100,0	2.497	43,1	1.682	29,1	1.608	27,8
2018	5.487	100,0	2.324	42,4	1.751	31,9	1.412	25,7
2019	5.321	100,0	2.601	48,9	1.453	27,3	1.267	23,8
2020	3.388	100,0	1.790	52,8	865	25,5	733	21,6
2021	3.704	100,0	2.113	57,0	948	25,6	643	17,4
2022	4.314	100,0	2.284	52,9	1.204	27,9	826	19,1
2023	4.436	100,0	2.240	50,5	1.314	29,6	882	19,9
2024	4.236	100,0	2.292	54,1	1.192	28,1	752	17,8
2025	3.829	100,0	2.041	53,3	1.139	29,7	649	16,9

Tabela XVII

Zapadalność na gruźlicę płuc wg stanu bakteriologicznego w Polsce w latach 1972- 2025.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Pulmonary tuberculosis cases and pulmonary tuberculosis notification rates by result of bacteriological examination. Poland 1972-2025. Rates per 100.000 population.

ROK Year	Gruźlica płuc Pulmonary TB		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed				Niepotwierdzone bakteriologicznie Not confirmed	
			Bakterioskopia dodatnia / smear positive		Bakterioskopia ujemna lub nieznana/ smear negative, unknown			
	Liczba N	Wsp. R	Liczba N	Wsp. R	Liczba N	Wsp. R	Liczba N	Wsp. R
1972	33.458	101,2	9.328	28,2	8.084	24,5	16.046	48,5
1975	24.454	71,9	9.468	27,9	6.812	20,0	8.174	24,0
1980	24.082	67,7	7.698	21,6	6.325	17,8	10.059	28,3
1990	15.316	40,2	4.556	12,0	3.716	9,7	7.044	18,5
1995	15.130	39,2	4.273	11,1	3.664	9,5	7.193	18,6
1996	14.761	38,2	4.137	10,7	3.753	9,7	6.871	17,8
1997	13.396	34,7	4.054	10,5	3.225	8,4	6.117	15,8
1998	12.799	33,1	4.049	10,5	3.228	8,5	5.462	14,1
1999	11.641	30,1	3.711	9,6	2.818	7,3	5.112	14,1
2000	10.960	28,4	3.713	9,6	2.640	6,8	4.607	11,9
2001	10.183	26,4	3.636	9,4	2.258	5,8	4.289	11,1
2002	9.438	24,7	3.432	9,0	2.162	5,7	3.844	10,1
2003	9.207	24,1	3.501	9,2	2.057	5,4	3.649	9,6
2004	8.691	22,8	3.219	8,4	1.889	4,9	3.583	9,4
2005	8.449	22,1	3.253	8,5	1.916	5,0	3.280	8,6
2006	7.879	20,7	3.307	8,7	1.682	4,4	2.890	7,6
2007	7.986	21,0	3.291	8,6	1.909	5,0	2.786	7,3
2008	7.484	19,6	3.047	8,0	1.845	4,8	2.592	6,8
2009	7.654	20,1	3.063	8,0	1.972	5,2	2.619	6,9
2010	6.992	18,3	2.803	7,3	1.782	4,7	2.407	6,3
2011	7.879	20,6	2.916	7,6	2.411	6,3	2.552	6,7
2012	7.018	18,2	2.778	7,2	2.092	5,4	2.148	5,6
2013	6.835	17,8	2.859	7,4	1.804	4,7	2.172	5,6
2014	6.311	16,4	2.800	7,3	1.803	4,7	1.708	4,4
2015	6.078	15,8	2.714	7,1	1.758	4,6	1.606	4,2
2016	6.116	15,9	2.612	6,8	1.863	4,8	1.641	4,3
2017	5.531	14,4	2.472	6,4	1.585	4,1	1.474	3,8
2018	5.244	13,7	2.324	6,1	1.611	4,2	1.309	3,4
2019	5.075	13,2	2.565	6,7	1.361	3,5	1.149	3,0
2020	3.237	8,4	1.771	4,6	802	2,1	664	1,7
2021	3.553	9,3	2.085	5,5	885	2,3	583	1,5
2022	4.148	11,0	2.265	6,0	1.131	3,0	752	2,0
2023	4.265	11,3	2.221	5,9	1.239	3,3	805	2,1
2024	4.093	10,9	2.269	6,0	1.122	3,0	702	1,9
2025	3.681	9,8	2.022	5,4	1.063	2,8	596	1,6

Tabela XVIII

Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc wg wyniku badania bakteriologicznego w Polsce w latach 1972-2025.

Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination. Poland 1972-2025.

ROK Year	Gruźlica ukt. oddech./płuc Pulmonary TB		Potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed				Niepotwierdzone bakteriologicznie Not confirmed	
			Bakterioskopia dodatnia / smear positive		Bakterioskopia ujemna lub nieznana/ smear negative, unknown			
	liczba (N)	%	liczba (N)	%	liczba (N)	%	liczba (N)	%
1972	33.458	100,0	9.328	27,9	8.084	24,2	16.046	47,9
1975	24.456	100,0	9.468	38,7	6.812	27,9	8.176	33,4
1980	24.082	100,0	7.698	32,0	6.325	26,3	10.059	41,7
1990	15.316	100,0	4.556	29,7	3.716	24,3	7.044	46,0
1991	15.625	100,0	4.866	31,1	3.771	24,1	6.988	44,7
1992	15.717	100,0	4.990	31,7	3.632	23,1	7.095	45,2
1993	15.953	100,0	4.931	30,9	3.836	24,1	7.186	45,0
1994	15.752	100,0	4.603	29,2	3.657	23,2	7.492	47,6
1995	15.130	100,0	4.273	28,2	3.664	24,2	7.193	47,6
1996	14.761	100,0	4.137	28,0	3.753	25,4	6.871	46,6
1997	13.396	100,0	4.054	30,2	3.225	24,1	6.117	45,7
1998	12.799	100,0	4.049	31,6	3.288	25,7	5.462	42,7
1999	11.641	100,0	3.711	31,9	2.818	24,2	5.112	43,9
2000	10.960	100,0	3.713	33,9	2.640	24,1	4.607	42,0
2001	10.183	100,0	3.636	35,7	2.258	22,2	4.289	42,1
2002	9.438	100,0	3.432	36,4	2.162	22,9	3.844	40,7
2003	9.207	100,0	3.501	38,0	2.057	22,4	3.649	39,6
2004	8.691	100,0	3.219	37,0	1.889	21,7	3.583	41,3
2005	8.449	100,0	3.253	38,5	1.916	22,7	3.280	38,8
2006	7.879	100,0	3.307	42,0	1.682	21,4	2.890	36,7
2007	7.986	100,0	3.291	41,2	1.909	23,9	2.786	34,9
2008	7.484	100,0	3.047	40,7	1.845	24,7	2.592	34,6
2009	7.654	100,0	3.063	40,0	1.972	25,8	2.619	34,2
2010	6.992	100,0	2.803	40,1	1.782	25,5	2.407	34,4
2011	7.879	100,0	2.916	37,0	2.411	30,6	2.552	32,4
2012	7.018	100,0	2.778	39,6	2.092	29,8	2.148	30,6
2013	6.835	100,0	2.859	41,8	1.804	26,4	2.172	31,8
2014	6.311	100,0	2.800	44,4	1.803	28,6	1.708	27,1
2015	6.078	100,0	2.714	44,7	1.758	28,9	1.606	26,4
2016	6.116	100,0	2.612	42,7	1.863	30,5	1.641	26,8
2017	5.531	100,0	2.472	44,7	1.585	28,7	1.474	26,6
2018	5.244	100,0	2.324	44,3	1.611	30,7	1.309	25,0
2019	5.075	100,0	2.565	50,5	1.361	26,8	1.149	22,6
2020	3.237	100,0	1.771	54,7	802	24,8	664	20,5
2021	3.553	100,0	2085	58,7	885	24,9	583	16,4
2022	4.148	100,0	2.265	54,6	1.131	27,3	752	18,1
2023	4.265	100,0	2.221	52,1	1.239	29,1	805	18,9
2024	4.093	100,0	2.269	55,4	1.122	27,4	705	17,2
2025	3.681	100,0	2.022	54,9	1.063	28,9	596	16,2

Rycina 6

Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc zarejestrowanych w Polsce w 2025 r.

Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total cases). Poland 2025.

Gruźlica płuc / Pulmonary TB:

3 681

Potwierdzona bakteriologicznie i dodatni wynik bakterioskopii/conf. S.+	2 022	/54,9/
Tylko posiew/only culture positive:	1 063	/28,9/
Nie potwierdzona/Not confirmed:	596	/16,2/




Tabela XIX

Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg województw.

Tuberculosis cases by result of bacteriological examination and voivodeships (numbers and percentage). Poland 2025.

Województwa Voivodeships	Wszystkie przypadki Total registerered cases		Przypadki potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases				Przypadki niepotwierdzone bakteriologicznie Not confirmed cases	
			Bakterioskopia dodatnia / smear positive		Bakterioskopia ujemna lub nieznana/ smear negative, unknown			
	liczba / N	%	liczba / N	%	liczba / N	%	liczba / N	%
POLSKA	3829	100%	2041	53,3%	1139	29,7%	649	17,0%
1. Dolnośląskie	315	100%	201	63,81%	74	23,49%	40	12,70%
2. Kujawsko-pomorskie	206	100%	133	64,6%	52	25,2%	21	10,2%
3. Lubelskie	270	100%	106	39,3%	83	30,7%	81	30,0%
4. Lubuskie	134	100%	69	51,5%	30	22,4%	35	26,1%
5. Łódzkie	259	100%	96	37,1%	84	32,4%	79	30,5%
6. Małopolskie	364	100%	226	62,1%	86	23,6%	52	14,3%
7. Mazowieckie	491	100%	255	51,9%	199	40,5%	37	7,5%
8. Opolskie	78	100%	40	51,3%	14	17,9%	24	30,8%
9. Podkarpackie	186	100%	94	50,5%	53	28,5%	39	21,0%
10. Podlaskie	85	100%	47	55,29%	26	30,6%	12	14,12%
11. Pomorskie	250	100%	145	58,0%	80	32,0%	25	10,0%
12. Śląskie	618	100%	312	50,5%	170	27,5%	136	22,0%
13. Świętokrzyskie	130	100%	64	49,2%	48	36,9%	18	13,8%
14. Warmińsko-mazurskie	90	100%	44	48,9%	31	34,4%	15	16,7%
15. Wielkopolskie	177	100%	111	62,7%	56	31,6%	10	5,6%
16. Zachodniopomorskie	176	100%	98	55,7%	53	30,1%	25	14,2%

Tabela XX

Struktura bakteriologiczna chorych na gruźlicę płuc w Polsce w 2025 r. wg województw.

Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination and voivodeships (numbers and percentage).


Poland 2025.

Województwa Voivodeships	Wszystkie przypadki Total registerered cases		Przypadki potwierdzone bakteriologicznie Bacteriologically confirmed cases				Przypadki niepotwierdzone bakteriologicznie Not confirmed cases	
			Bakterioskopia dodatnia / smear positive		Bakterioskopia ujemna lub nieznana/ smear negative, unknown			
	Liczba/ N	%	Liczba/ N	%	Liczba/ N	%	Liczba/ N	%
POLSKA	3681	100%	2022	54,9%	1063	28,9%	596	16,2%
1. Dolnośląskie	295	100%	197	66,8%	65	22,0%	33	11,2%
2. Kujawsko-pomorskie	198	100%	132	66,7%	47	23,7%	19	9,6%
3. Lubelskie	263	100%	105	39,9%	80	30,4%	78	29,7%
4. Lubuskie	127	100%	69	54,3%	28	22,0%	30	23,6%
5. Łódzkie	252	100%	95	37,7%	80	31,7%	77	30,6%
6. Małopolskie	350	100%	225	64,3%	80	22,9%	45	12,9%
7. Mazowieckie	477	100%	254	53,2%	190	39,8%	33	6,9%
8. Opolskie	75	100%	40	53,3%	13	17,3%	22	29,3%
9. Podkarpackie	180	100%	94	52,2%	50	27,8%	36	20,0%
10. Podlaskie	83	100%	47	56,6%	24	28,9%	12	14,5%
11. Pomorskie	234	100%	144	61,5%	71	30,3%	19	8,1%
12. Śląskie	605	100%	312	51,6%	162	26,8%	131	21,7%
13. Świętokrzyskie	120	100%	61	50,8%	42	35,0%	17	14,2%
14. Warmińsko-mazurskie	82	100%	43	52,4%	27	32,9%	12	14,6%
15. Wielkopolskie	168	100%	108	64,3%	51	30,4%	9	5,4%
16. Zachodniopomorskie	172	100%	96	55,8%	53	30,8%	23	13,4%

Rycina 7

Struktura bakteriologiczna zachorowań na gruźlicę płuc w Polsce w latach 1970 – 2025.

Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total PTB cases). Poland 1970 –2025.



Rycina 8

Nowe zachorowania i wznowy gruźlicy płuc wg stanu bakteriologicznego w Polsce w 2025 roku.

Pulmonary tuberculosis cases by result of bacteriological examination (percentage of total cases). Poland 2025.




Tabela XXI

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases (all forms) and tuberculosis notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	3829	64	37	1167	1599	962	10,2	1,2	1,8	9,6	16,0	12,3
1. Dolnośląskie	315	1	3	110	133	68	11,0	0,3	2,1	11,6	17,7	10,9
2. Kujawsko-pomorskie	206	4	4	66	98	34	10,4	1,4	3,6	10,4	18,2	8,1
3. Lubelskie	270	3	-	74	96	97	13,6	1,1	-	11,7	17,9	22,3
4. Lubuskie	134	8	1	32	56	37	13,9	5,9	1,8	10,4	21,3	18,0
5. Łódzkie	259	3	3	66	103	84	11,1	0,9	2,5	9,2	16,2	15,5
6. Małopolskie	364	12	4	95	135	118	10,6	2,3	2,2	8,1	15,2	18,1
7. Mazowieckie	491	7	3	172	210	99	8,9	0,8	1,0	9,3	14,7	9,1
8. Opolskie	78	1	3	24	36	14	8,4	0,8	6,6	8,3	13,5	6,9
9. Podkarpackie	186	1	-	52	80	53	9,0	0,3	-	7,7	14,4	12,9
10. Podlaskie	85	-	-	25	35	25	7,5	-	-	6,9	11,4	10,6
11. Pomorskie	250	13	4	75	105	53	10,6	3,5	3,0	9,4	17,4	11,7
12. Śląskie	618	2	7	193	279	137	14,5	0,3	3,2	14,5	23,5	14,4
13. Świętokrzyskie	130	4	1	27	54	44	11,3	2,7	1,6	7,6	17,0	16,2
14. Warmińsko-mazurskie	90	2	1	33	31	23	6,7	1,1	1,3	7,6	8,4	8,3
15. Wielkopolskie	177	2	2	66	73	34	5,1	0,4	1,0	5,7	8,0	5,0
16. Zachodniopomorskie	176	1	1	57	75	42	10,9	0,5	1,2	11,1	17,0	11,6

Tabela XXII

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases (without relapses) and tuberculosis notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	3374	64	33	1033	1379	865	9,0	1,2	1,6	8,5	13,8	11,1
1. Dolnośląskie	263	1	3	96	107	56	9,2	0,3	2,1	10,1	14,2	9,0
2. Kujawsko-pomorskie	183	4	4	59	86	30	9,3	1,4	3,6	9,3	16,0	7,2
3. Lubelskie	224	3	-	64	78	79	11,3	1,1	-	10,2	14,5	18,2
4. Lubuskie	121	8	1	29	50	33	12,5	5,9	1,8	9,4	19,0	16,0
5. Łódzkie	234	3	2	59	95	75	10,0	0,9	1,6	8,2	14,9	13,9
6. Małopolskie	323	12	4	83	117	107	9,4	2,3	2,2	7,1	13,2	16,4
7. Mazowieckie	431	7	3	150	177	94	7,8	0,8	1,0	8,1	12,4	8,7
8. Opolskie	65	1	3	20	27	14	7,0	0,8	6,6	6,9	10,1	6,9
9. Podkarpackie	169	1	-	49	71	48	8,2	0,3	-	7,2	12,8	11,7
10. Podlaskie	66	-	-	18	27	21	5,8	-	-	5,0	8,8	8,9
11. Pomorskie	229	13	2	71	92	51	9,7	3,5	1,5	8,9	15,2	11,3
12. Śląskie	551	2	6	172	244	127	12,9	0,3	2,7	12,9	20,5	13,4
13. Świętokrzyskie	114	4	1	24	43	42	9,9	2,7	1,6	6,8	13,5	15,5
14. Warmińsko-mazurskie	87	2	1	32	30	22	6,5	1,1	1,3	7,4	8,1	7,9
15. Wielkopolskie	155	2	2	59	64	28	4,5	0,4	1,0	5,1	7,0	4,2
16. Zachodniopomorskie	159	1	1	48	71	38	9,8	0,5	1,2	9,3	16,1	10,5

Tabela XXIII

Zapadalność na gruźlicę płuc w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Pulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	3681	54	35	1112	1561	919	9,8	1,0	1,7	9,1	15,6	11,8
1. Dolnośląskie	295	1	2	102	124	66	10,3	0,3	1,4	10,7	16,5	10,6
2. Kujawsko-pomorskie	198	3	4	64	97	30	10,0	1,1	3,6	10,1	18,0	7,2
3. Lubelskie	263	3	-	71	95	94	13,2	1,1	-	11,3	17,7	21,6
4. Lubuskie	127	8	1	30	54	34	13,1	5,9	1,8	9,7	20,5	16,5
5. Łódzkie	252	2	3	63	101	83	10,8	0,6	2,5	8,7	15,9	15,3
6. Małopolskie	350	10	4	90	133	113	10,2	1,9	2,2	7,7	15,0	17,4
7. Mazowieckie	477	5	2	165	207	98	8,7	0,6	0,7	8,9	14,5	9,0
8. Opolskie	75	1	3	23	34	14	8,1	0,8	6,6	7,9	12,7	6,9
9. Podkarpackie	180	1	-	51	77	51	8,7	0,3	-	7,5	13,9	12,5
10. Podlaskie	83	-	-	25	34	24	7,3	-	-	6,9	11,0	10,2
11. Pomorskie	234	11	4	71	102	46	9,9	3,0	3,0	8,9	16,9	10,2
12. Śląskie	605	1	7	187	278	132	14,2	0,2	3,2	14,0	23,4	13,9
13. Świętokrzyskie	120	4	1	25	51	39	10,4	2,7	1,6	7,1	16,1	14,4
14. Warmińsko-mazurskie	82	2	1	29	30	20	6,1	1,1	1,3	6,7	8,1	7,2
15. Wielkopolskie	168	1	2	61	70	34	4,8	0,2	1,0	5,3	7,7	5,0
16. Zachodniopomorskie	172	1	1	55	74	41	10,6	0,5	1,2	10,7	16,7	11,4

Tabela XXIV

Zapadalność na gruźlicę płuc (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Pulmonary tuberculosis cases (without relapses) and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	3232	54	31	981	1344	822	8,6	1,0	1,5	8,0	13,4	10,6
1. Dolnośląskie	245	1	2	89	99	54	8,6	0,3	1,4	9,4	13,1	8,7
2. Kujawsko-pomorskie	175	3	4	57	85	26	8,8	1,1	3,6	9,0	15,8	6,2
3. Lubelskie	217	3	-	61	77	76	10,9	1,1	-	9,7	14,3	17,5
4. Lubuskie	114	8	1	27	48	30	11,8	5,9	1,8	8,8	18,2	14,6
5. Łódzkie	227	2	2	56	93	74	9,7	0,6	1,6	7,8	14,6	13,7
6. Małopolskie	309	10	4	78	115	102	9,0	1,9	2,2	6,6	13,0	15,7
7. Mazowieckie	418	5	2	144	174	93	7,6	0,6	0,7	7,8	12,2	8,6
8. Opolskie	63	1	3	19	26	14	6,8	0,8	6,6	6,5	9,7	6,9
9. Podkarpackie	163	1	-	48	68	46	7,9	0,3	-	7,1	12,2	11,2
10. Podlaskie	64	-	-	18	26	20	5,7	-	-	5,0	8,4	8,5
11. Pomorskie	213	11	2	67	89	44	9,0	3,0	1,5	8,4	14,7	9,7
12. Śląskie	538	1	6	166	243	122	12,6	0,2	2,7	12,4	20,4	12,9
13. Świętokrzyskie	104	4	1	22	40	37	9,0	2,7	1,6	6,2	12,6	13,7
14. Warmińsko-mazurskie	80	2	1	29	29	19	6,0	1,1	1,3	6,7	7,8	6,8
15. Wielkopolskie	147	1	2	54	62	28	4,2	0,2	1,0	4,7	6,8	4,2
16. Zachodniopomorskie	155	1	1	46	70	37	9,6	0,5	1,2	9,0	15,8	10,3

Tabela XXV

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025.

Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	3085	21	20	987	1349	708	8,2	0,4	1,0	8,1	13,5	9,1
1. Dolnośląskie	262	1	1	87	112	61	9,2	0,3	0,7	9,2	14,9	9,8
2. Kujawsko-pomorskie	179	-	1	59	90	29	9,1	-	0,9	9,3	16,7	6,9
3. Lubelskie	185	3	-	56	71	55	9,3	1,1	-	8,9	13,2	12,6
4. Lubuskie	97	-	1	24	49	23	10,0	-	1,8	7,8	18,6	11,2
5. Łódzkie	175	1	2	48	70	54	7,5	0,3	1,6	6,7	11,0	10,0
6. Małopolskie	305	4	2	83	123	93	8,9	0,8	1,1	7,1	13,9	14,3
7. Mazowieckie	444	1	1	156	195	91	8,1	0,1	0,3	8,5	13,7	8,4
8. Opolskie	53	-	1	16	25	11	5,7	-	2,2	5,5	9,4	5,4
9. Podkarpackie	144	1	-	46	62	35	7,0	0,3	-	6,8	11,2	8,5
10. Podlaskie	71	-	-	23	30	18	6,3	-	-	6,3	9,7	7,6
11. Pomorskie	215	2	2	70	97	44	9,1	0,5	1,5	8,7	16,1	9,7
12. Śląskie	474	1	4	159	222	88	11,1	0,2	1,8	11,9	18,7	9,3
13. Świętokrzyskie	103	4	1	22	45	31	8,9	2,7	1,6	6,2	14,2	11,4
14. Warmińsko-mazurskie	70	2	1	27	26	14	5,2	1,1	1,3	6,2	7,0	5,0
15. Wielkopolskie	159	-	2	61	64	32	4,6	-	1,0	5,3	7,0	4,7
16. Zachodniopomorskie	149	1	1	50	68	29	9,2	0,5	1,2	9,7	15,4	8,0

Tabela XXVI

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie (bez wznów) w Polsce w roku 2025 wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases (without relapses) and notification rates by age groups and voivodeships.

Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	2733	21	16	871	1182	643	7,3	0,4	0,8	7,1	11,8	8,3
1. Dolnośląskie	219	1	1	77	90	50	7,7	0,3	0,7	8,1	11,9	8,0
2. Kujawsko-pomorskie	156	-	1	52	78	25	7,9	-	0,9	8,2	14,5	6,0
3. Lubelskie	160	3	-	47	61	49	8,0	1,1	-	7,5	11,4	11,3
4. Lubuskie	85	-	1	21	43	20	8,8	-	1,8	6,8	16,3	9,7
5. Łódzkie	157	1	1	42	65	48	6,7	0,3	0,8	5,8	10,2	8,9
6. Małopolskie	270	4	2	72	108	84	7,9	0,8	1,1	6,1	12,2	12,9
7. Mazowieckie	390	1	1	137	165	86	7,1	0,1	0,3	7,4	11,6	7,9
8. Opolskie	46	-	1	13	21	11	5,0	-	2,2	4,5	7,9	5,4
9. Podkarpackie	132	1	-	43	55	33	6,4	0,3	-	6,3	9,9	8,1
10. Podlaskie	55	-	-	17	24	14	4,9	-	-	4,7	7,8	5,9
11. Pomorskie	195	2	-	66	85	42	8,3	0,5	-	8,2	14,1	9,3
12. Śląskie	437	1	3	142	205	86	10,2	0,2	1,4	10,6	17,2	9,1
13. Świętokrzyskie	89	4	1	19	35	30	7,7	2,7	1,6	5,4	11,0	11,1
14. Warmińsko-mazurskie	69	2	1	27	26	13	5,1	1,1	1,3	6,2	7,0	4,7
15. Wielkopolskie	139	-	2	54	57	26	4,0	-	1,0	4,7	6,3	3,9
16. Zachodniopomorskie	134	1	1	42	64	26	8,3	0,5	1,2	8,2	14,5	7,2

Tabela XXIII

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wg metod badania bakteriologicznego i województw w Polsce w roku 2025.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases and notification rates by methods of bacteriological examination and voivodeships. Poland 2025.

Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers			Współczynniki / Rates		
	Gruźlica płuc ogółem Total PTB	Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie PTB confirmed	Gruźlica płuc potwierdzona, rozmaz dodatni PTB conf. s+	Gruźlica płuc ogółem Total PTB	Gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie PTB confirmed	Gruźlica płuc potwierdzona, rozmaz dodatni PTB conf. s+
POLSKA	3681	3085	2022	9,8	8,2	5,4
1. Dolnośląskie	295	262	197	10,3	9,2	6,9
2. Kujawsko-pomorskie	198	179	132	10,0	9,1	6,7
3. Lubelskie	263	185	105	13,2	9,3	5,3
4. Lubuskie	127	97	69	13,1	10,0	7,1
5. Łódzkie	252	175	95	10,8	7,5	4,1
6. Małopolskie	350	305	225	10,2	8,9	6,6
7. Mazowieckie	477	444	254	8,7	8,1	4,6
8. Opolskie	75	53	40	8,1	5,7	4,3
9. Podkarpackie	180	144	94	8,7	7,0	4,6
10. Podlaskie	83	71	47	7,3	6,3	4,2
11. Pomorskie	234	215	144	9,9	9,1	6,1
12. Śląskie	605	474	312	14,2	11,1	7,3
13. Świętokrzyskie	120	103	61	10,4	8,9	5,3
14. Warmińsko-mazurskie	82	70	43	6,1	5,2	3,2
15. Wielkopolskie	168	159	108	4,8	4,6	3,1
16. Zachodniopomorskie	172	149	96	10,6	9,2	5,9

Tabela XXVIII

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie z dodatnim wynikiem bakterioskopii w Polsce w 2025 roku
wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Cases and notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis with positive sputum smear by age groups and voivodeships. Poland
2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	2022	4	13	661	952	392	5,4	0,1	0,6	5,4	9,5	5,0
1. Dolnośląskie	197	-	-	65	88	44	6,9	-	-	6,8	11,7	7,1
2. Kujawsko-pomorskie	132	-	1	48	67	16	6,7	-	0,9	7,6	12,5	3,8
3. Lubelskie	105	1	-	33	47	24	5,3	0,4	-	5,2	8,8	5,5
4. Lubuskie	69	-	1	17	33	18	7,1	-	1,8	5,5	12,5	8,7
5. Łódzkie	95	-	2	26	40	27	4,1	-	1,6	3,6	6,3	5,0
6. Małopolskie	225	1	2	62	100	60	6,6	0,2	1,1	5,3	11,3	9,2
7. Mazowieckie	254	1	-	88	123	42	4,6	0,1	-	4,8	8,6	3,9
8. Opolskie	40	-	1	11	22	6	4,3	-	2,2	3,8	8,2	3,0
9. Podkarpackie	94	-	-	35	40	19	4,6	-	-	5,2	7,2	4,6
10. Podlaskie	47	-	-	16	25	6	4,2	-	-	4,4	8,1	2,5
11. Pomorskie	144	-	1	48	73	22	6,1	-	0,7	6,0	12,1	4,9
12. Śląskie	312	-	3	105	157	47	7,3		1,4	7,9	13,2	5,0
13. Świętokrzyskie	61	1	-	11	32	17	5,3	0,7	-	3,1	10,1	6,3
14. Warmińsko-mazurskie	43	-	-	19	14	10	3,2	-	-	4,4	3,8	3,6
15. Wielkopolskie	108	-	1	44	45	18	3,1	-	0,5	3,8	5,0	2,7
16. Zachodniopomorskie	96	-	1	33	46	16	5,9	-	1,2	6,4	10,4	4,4

Tabela XXIX

Zapadalność na gruźlicę pozapłucną w Polsce w 2025 roku wg grup wieku i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Extrapulmonary tuberculosis cases and notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynniki / Rates					
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	148	10	2	55	38	43	0,4	0,2	0,1	0,5	0,4	0,6
1. Dolnośląskie	20	-	1	8	9	2	0,7	-	0,7	0,8	1,2	0,3
2. Kujawsko-pomorskie	8	1	-	2	1	4	0,4	0,4	-	0,3	0,2	1,0
3. Lubelskie	7	-	-	3	1	3	0,4	-	-	0,5	0,2	0,7
4. Lubuskie	7	-	-	2	2	3	0,7	-	-	0,6	0,8	1,5
5. Łódzkie	7	1	-	3	2	1	0,3	0,3	0,0	0,4	0,3	0,2
6. Małopolskie	14	2	-	5	2	5	0,4	0,4	-	0,4	0,2	0,8
7. Mazowieckie	14	2	1	7	3	1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,1
8. Opolskie	3	-	-	1	2	-	0,3	-	-	0,3	0,7	-
9. Podkarpackie	6	-	-	1	3	2	0,3	-	-	0,1	0,5	0,5
10. Podlaskie	2	-	-	-	1	1	0,2	-	-	0,0	0,3	0,4
11. Pomorskie	16	2	-	4	3	7	0,7	0,5	-	0,5	0,5	1,5
12. Śląskie	13	1	-	6	1	5	0,3	0,2	-	0,4	0,1	0,5
13. Świętokrzyskie	10	-	-	2	3	5	0,9	-	-	0,6	0,9	1,8
14. Warmińsko-mazurskie	8	-	-	4	1	3	0,6	-	-	0,9	0,3	1,1
15. Wielkopolskie	9	1	-	5	3	-	0,3	0,2	-	0,4	0,3	-
16. Zachodniopomorskie	4	-	-	2	1	1	0,2	-	-	0,4	0,2	0,3

Tabela XXX

Zachorowania na gruźlicę pozapłucną potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w 2025 roku wg grup wieku i województw.

Culture confirmed extrapulmonary tuberculosis by age groups and voivodeships. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	Liczby / Numbers						Współczynnik/ Ratio
	razem	0-14	15-19	20-44	45-64	65+	razem
POLSKA	95	3	1	38	25	28	0,3
1. Dolnośląskie	13	-	-	6	5	2	0,5
2. Kujawsko-pomorskie	6	-	-	2	1	3	0,3
3. Lubelskie	4	-	-	2	1	1	0,2
4. Lubuskie	2	-	-	-	1	1	0,2
5. Łódzkie	5	-	-	2	2	1	0,2
6. Małopolskie	7	-	-	3	1	3	0,2
7. Mazowieckie	10	-	1	6	2	1	0,2
8. Opolskie	1	-	-	1	-	-	0,1
9. Podkarpackie	3	-	-	1	1	1	0,1
10. Podlaskie	2	-	-		1	1	0,2
11. Pomorskie	10	1	-	3	2	4	0,4
12. Śląskie	8	1	-	3	1	3	0,2
13. Świętokrzyskie	9	-	-	2	2	5	0,8
14. Warmińsko-mazurskie	5	-	-	2	1	2	0,4
15. Wielkopolskie	8	1	-	4	3	-	0,2
16. Zachodniopomorskie	2	-	-	1	1	-	0,1

Tabela XXXI

Zachorowania na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, poprzedniego leczenia i województw.

Tuberculosis cases by site of disease, history of previous treatment and voivodeships. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	Gruźlica wszystkich postaci TB all forms			Gruźlica płuc. Pulmonary TB			Gruźlica pozapłucna Extrapulmonary TB		
	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses
Polska	3829	3374	455	3681	3232	449	148	142	6
1. Dolnośląskie	315	263	52	295	245	50	20	18	2
2. Kujawsko-pomorskie	206	183	23	198	175	23	8	8	-
3. Lubelskie	270	224	46	263	217	46	7	7	-
4. Lubuskie	134	121	13	127	114	13	7	7	-
5. Łódzkie	259	234	25	252	227	25	7	7	-
6. Małopolskie	364	323	41	350	309	41	14	14	-
7. Mazowieckie	491	431	60	477	418	59	14	13	1
8. Opolskie	78	65	13	75	63	12	3	2	1
9. Podkarpackie	186	169	17	180	163	17	6	6	-
10. Podlaskie	85	66	19	83	64	19	2	2	-
11. Pomorskie	250	229	21	234	213	21	16	16	-
12. Śląskie	618	551	67	605	538	67	13	13	-
13. Świętokrzyskie	130	114	16	120	104	16	10	10	-
14. Warmińsko-mazurskie	90	87	3	82	80	2	8	7	1
15. Wielkopolskie	177	155	22	168	147	21	9	8	1
16. Zachodniopomorskie	176	159	17	172	155	17	4	4	-

Tabela XXXII

Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian, poprzedniego leczenia i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.
Tuberculosis notification rates by site of disease, history of previous treatment and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Gruźlica wszystkich postaci TB all forms			Gruźlica płuc. Pulmonary TB			Gruźlica pozapłucna Extrapulmonary TB		
	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses	Razem/ Total	Nowe zach./ New cases	Wznowy/ Relapses
Polska	10,2	9,0	1,2	9,8	8,6	1,2	0,4	0,4	0,0
1. Dolnośląskie	11,0	9,2	1,8	10,3	8,6	1,7	0,7	0,6	0,1
2. Kujawsko-pomorskie	10,4	9,3	1,2	10,0	8,8	1,2	0,4	0,4	-
3. Lubelskie	13,6	11,3	2,3	13,2	10,9	2,3	0,4	0,4	-
4. Lubuskie	13,9	12,5	1,3	13,1	11,8	1,3	0,7	0,7	-
5. Łódzkie	11,1	10,0	1,1	10,8	9,7	1,1	0,3	0,3	-
6. Małopolskie	10,6	9,4	1,2	10,2	9,0	1,2	0,4	0,4	-
7. Mazowieckie	8,9	7,8	1,1	8,7	7,6	1,1	0,3	0,2	0,0
8. Opolskie	8,4	7,0	1,4	8,1	6,8	1,3	0,3	0,2	0,1
9. Podkarpackie	9,0	8,2	0,8	8,7	7,9	0,8	0,3	0,3	-
10. Podlaskie	7,5	5,8	1,7	7,3	5,7	1,7	0,2	0,2	-
11. Pomorskie	10,6	9,7	0,9	9,9	9,0	0,9	0,7	0,7	-
12. Śląskie	14,5	12,9	1,6	14,2	12,6	1,6	0,3	0,3	-
13. Świętokrzyskie	11,3	9,9	1,4	10,4	9,0	1,4	0,9	0,9	-
14. Warmińsko-mazurskie	6,7	6,5	0,2	6,1	6,0	0,1	0,6	0,5	0,1
15. Wielkopolskie	5,1	4,5	0,6	4,8	4,2	0,6	0,3	0,2	0,0
16. Zachodniopomorskie	10,9	9,8	1,1	10,6	9,6	1,1	0,2	0,2	-

Tabela XXXIII

Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w Polsce w 2025 roku wg lokalizacji zmian i województw. Współczynniki na 100.000 ludności.

Tuberculosis cases and notification rates (without relapses) by site of disease and voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Gruźlica ogółem TB total		Gruźlica płuc. Pulmonary TB		Gruźlica pozapłucna Extrapulmonary TB	
	Liczba / Number	Wsp. /Rate	Liczba / Number	Wsp. /Rate	Liczba / Number	Wsp. /Rate
Polska	3374	9,0	3232	8,6	142	0,4
1. Dolnośląskie	263	9,2	245	8,6	18	0,6
2. Kujawsko-pomorskie	183	9,3	175	8,8	8	0,4
3. Lubelskie	224	11,3	217	10,9	7	0,4
4. Lubuskie	121	12,5	114	11,8	7	0,7
5. Łódzkie	234	10,0	227	9,7	7	0,3
6. Małopolskie	323	9,4	309	9,0	14	0,4
7. Mazowieckie	431	7,8	418	7,6	13	0,2
8. Opolskie	65	7,0	63	6,8	2	0,2
9. Podkarpackie	169	8,2	163	7,9	6	0,3
10. Podlaskie	66	5,8	64	5,7	2	0,2
11. Pomorskie	229	9,7	213	9,0	16	0,7
12. Śląskie	551	12,9	538	12,6	13	0,3
13. Świętokrzyskie	114	9,9	104	9,0	10	0,9
14. Warmińsko-mazurskie	87	6,5	80	6,0	7	0,5
15. Wielkopolskie	155	4,5	147	4,2	8	0,2
16. Zachodniopomorskie	159	9,8	155	9,6	4	0,2

Tabela XXXIV

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2025.
Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	10,2	Polska	10,2
1. Dolnośląskie	11,0	1. Wielkopolskie	5,1
2. Kujawsko-pomorskie	10,4	2. Warmińsko-mazurskie	6,7
3. Lubelskie	13,6	3. Podlaskie	7,5
4. Lubuskie	13,9	4. Opolskie	8,4
5. Łódzkie	11,1	5. Mazowieckie	8,9
6. Małopolskie	10,6	6. Podkarpackie	9,0
7. Mazowieckie	8,9	7. Kujawsko-pomorskie	10,4
8. Opolskie	8,4	8. Pomorskie	10,6
9. Podkarpackie	9,0	9. Małopolskie	10,6
10. Podlaskie	7,5	10. Zachodniopomorskie	10,9
11. Pomorskie	10,6	11. Dolnośląskie	11,0
12. Śląskie	14,5	12. Łódzkie	11,1
13. Świętokrzyskie	11,3	13. Świętokrzyskie	11,3
14. Warmińsko-mazurskie	6,7	14. Lubelskie	13,6
15. Wielkopolskie	5,1	15. Lubuskie	13,9
16. Zachodniopomorskie	10,9	16. Śląskie	14,5

Mapa 1

Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg województw. Współczynniki na 100.000 ludności.
Tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.




Tabela XXXV

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci (bez wznów) w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates (without relapses). Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	9,0	Polska	9,0
1. Dolnośląskie	9,2	1. Wielkopolskie	4,5
2. Kujawsko-pomorskie	9,3	2. Podlaskie	5,8
3. Lubelskie	11,3	3. Warmińsko-mazurskie	6,5
4. Lubuskie	12,5	4. Opolskie	7,0
5. Łódzkie	10,0	5. Mazowieckie	7,8
6. Małopolskie	9,4	6. Podkarpackie	8,2
7. Mazowieckie	7,8	7. Dolnośląskie	9,2
8. Opolskie	7,0	8. Kujawsko-pomorskie	9,3
9. Podkarpackie	8,2	9. Małopolskie	9,4
10. Podlaskie	5,8	10. Pomorskie	9,7
11. Pomorskie	9,7	11. Zachodniopomorskie	9,8
12. Śląskie	12,9	12. Świętokrzyskie	9,9
13. Świętokrzyskie	9,9	13. Łódzkie	10,0
14. Warmińsko-mazurskie	6,5	14. Lubelskie	11,3
15. Wielkopolskie	4,5	15. Lubuskie	12,5
16. Zachodniopomorskie	9,8	16. Śląskie	12,9

TABELA XXXVI

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg płci - mężczyźni - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 mężczyzn.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and sex.

Males. Poland 2025. Rates per 100.000 males.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	16,0	Polska	16,0
1. Dolnośląskie	17,9	1. Wielkopolskie	7,7
2. Kujawsko-pomorskie	16,9	2. Warmińsko-mazurskie	9,2
3. Lubelskie	20,7	3. Podlaskie	12,6
4. Lubuskie	19,2	4. Opolskie	13,6
5. Łódzkie	16,1	5. Podkarpackie	14,5
6. Małopolskie	16,1	6. Mazowieckie	14,6
7. Mazowieckie	14,6	7. Świętokrzyskie	14,8
8. Opolskie	13,6	8. Łódzkie	16,1
9. Podkarpackie	14,5	9. Małopolskie	16,1
10. Podlaskie	12,6	10. Zachodniopomorskie	16,8
11. Pomorskie	16,9	11. Kujawsko-pomorskie	16,9
12. Śląskie	23,6	12. Pomorskie	16,9
13. Świętokrzyskie	14,8	13. Dolnośląskie	17,9
14. Warmińsko-mazurskie	9,2	14. Lubuskie	19,2
15. Wielkopolskie	7,7	15. Lubelskie	20,7
16. Zachodniopomorskie	16,8	16. Śląskie	23,6

Tabela XXXVII

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg płci - kobiety - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 kobiet.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and sex. Females. Poland 2025. Rates per 100.000 females.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	4,9	Polska	4,9
1. Dolnośląskie	4,6	1. Wielkopolskie	2,6
2. Kujawsko-pomorskie	4,3	2. Podlaskie	2,8
3. Lubelskie	6,9	3. Opolskie	3,5
4. Lubuskie	8,8	4. Mazowieckie	3,7
5. Łódzkie	6,5	5. Podkarpackie	3,8
6. Małopolskie	5,4	6. Kujawsko-pomorskie	4,3
7. Mazowieckie	3,7	7. Warmińsko-mazurskie	4,4
8. Opolskie	3,5	8. Pomorskie	4,6
9. Podkarpackie	3,8	9. Dolnośląskie	4,6
10. Podlaskie	2,8	10. Zachodnio-pomorskie	5,3
11. Pomorskie	4,6	11. Małopolskie	5,4
12. Śląskie	6,0	12. Śląskie	6,0
13. Świętokrzyskie	7,9	13. Łódzkie	6,5
14. Warmińsko-mazurskie	4,4	14. Lubelskie	6,9
15. Wielkopolskie	2,6	15. Świętokrzyskie	7,9
16. Zachodniopomorskie	5,3	16. Lubuskie	8,8

Tabela XXXVIII

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania – miasto - w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and place of residence – urban areas. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	11,3	Polska	11,3
1. Dolnośląskie	11,9	1. Wielkopolskie	5,8
2. Kujawsko-pomorskie	11,9	2. Warmińsko-mazurskie	7,5
3. Lubelskie	12,9	3. Podlaskie	7,7
4. Lubuskie	16,5	4. Podkarpackie	9,2
5. Łódzkie	10,9	5. Mazowieckie	9,7
6. Małopolskie	11,7	6. Opolskie	9,8
7. Mazowieckie	9,7	7. Łódzkie	10,9
8. Opolskie	9,8	8. Świętokrzyskie	11,0
9. Podkarpackie	9,2	9. Pomorskie	11,6
10. Podlaskie	7,7	10. Małopolskie	11,7
11. Pomorskie	11,6	11. Kujawsko-pomorskie	11,9
12. Śląskie	16,6	12. Dolnośląskie	11,9
13. Świętokrzyskie	11,0	13. Zachodnio-pomorskie	12,0
14. Warmińsko-mazurskie	7,5	14. Lubelskie	12,9
15. Wielkopolskie	5,8	15. Lubuskie	16,5
16. Zachodniopomorskie	12,0	16. Śląskie	16,6

Tabela XXXIX

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wg miejsca zamieszkania – wieś
- w Polsce w roku 2025.

Współczynniki na 100.000 ludności.

*Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates and place of residence – rural areas. Poland 2025.
Rates per 100.000 population.*

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	8,6	Polska	8,6
1. Dolnośląskie	9,1	1. Wielkopolskie	4,3
2. Kujawsko-pomorskie	8,4	2. Warmińsko-mazurskie	5,6
3. Lubelskie	14,2	3. Opolskie	6,8
4. Lubuskie	9,2	4. Podlaskie	7,2
5. Łódzkie	11,4	5. Mazowieckie	7,5
6. Małopolskie	9,7	6. Śląskie	7,9
7. Mazowieckie	7,5	7. Kujawsko-pomorskie	8,4
8. Opolskie	6,8	8. Zachodniopomorskie	8,5
9. Podkarpackie	8,9	9. Podkarpackie	8,9
10. Podlaskie	7,2	10. Pomorskie	9,0
11. Pomorskie	9,0	11. Dolnośląskie	9,1
12. Śląskie	7,9	12. Lubuskie	9,2
13. Świętokrzyskie	11,5	13. Małopolskie	9,7
14. Warmińsko-mazurskie	5,6	14. Łódzkie	11,4
15. Wielkopolskie	4,3	15. Świętokrzyskie	11,5
16. Zachodniopomorskie	8,5	16. Lubelskie	14,2

Tabela XL

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by pulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	9,8	Polska	9,8
1. Dolnośląskie	10,3	1. Wielkopolskie	4,8
2. Kujawsko-pomorskie	10,0	2. Warmińsko-mazurskie	6,1
3. Lubelskie	13,2	3. Podlaskie	7,3
4. Lubuskie	13,1	4. Opolskie	8,1
5. Łódzkie	10,8	5. Mazowieckie	8,7
6. Małopolskie	10,2	6. Podkarpackie	8,7
7. Mazowieckie	8,7	7. Pomorskie	9,9
8. Opolskie	8,1	8. Kujawsko-pomorskie	10,0
9. Podkarpackie	8,7	9. Małopolskie	10,2
10. Podlaskie	7,3	10. Dolnośląskie	10,3
11. Pomorskie	9,9	11. Świętokrzyskie	10,4
12. Śląskie	14,2	12. Zachodniopomorskie	10,6
13. Świętokrzyskie	10,4	13. Łódzkie	10,8
14. Warmińsko-mazurskie	6,1	14. Lubuskie	13,1
15. Wielkopolskie	4,8	15. Lubelskie	13,2
16. Zachodniopomorskie	10,6	16. Śląskie	14,2

Tabela XLI

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc (bez wznów) w Polsce w roku 2025.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by pulmonary tuberculosis notification rates (without relapse). Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	8,6	Polska	8,6
1. Dolnośląskie	8,6	1. Wielkopolskie	4,2
2. Kujawsko-pomorskie	8,8	2. Podlaskie	5,7
3. Lubelskie	10,9	3. Warmińsko-mazurskie	6,0
4. Lubuskie	11,8	4. Opolskie	6,8
5. Łódzkie	9,7	5. Mazowieckie	7,6
6. Małopolskie	9,0	6. Podkarpackie	7,9
7. Mazowieckie	7,6	7. Dolnośląskie	8,6
8. Opolskie	6,8	8. Kujawsko-pomorskie	8,8
9. Podkarpackie	7,9	9. Małopolskie	9,0
10. Podlaskie	5,7	10. Świętokrzyskie	9,0
11. Pomorskie	9,0	11. Pomorskie	9,0
12. Śląskie	12,6	12. Zachodnio-pomorskie	9,6
13. Świętokrzyskie	9,0	13. Łódzkie	9,7
14. Warmińsko-mazurskie	6,0	14. Lubelskie	10,9
15. Wielkopolskie	4,2	15. Lubuskie	11,8
16. Zachodniopomorskie	9,6	16. Śląskie	12,6

Tabela XLII

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie. Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by culture confirmed tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	8,5	POLSKA	8,5
1. Dolnośląskie	9,6	1. Wielkopolskie	4,8
2. Kujawsko-pomorskie	9,4	2. Warmińsko-mazurskie	5,6
3. Lubelskie	9,5	3. Opolskie	5,8
4. Lubuskie	10,2	4. Podlaskie	6,5
5. Łódzkie	7,7	5. Podkarpackie	7,1
6. Małopolskie	9,1	6. Łódzkie	7,7
7. Mazowieckie	8,2	7. Mazowieckie	8,2
8. Opolskie	5,8	8. Małopolskie	9,1
9. Podkarpackie	7,1	9. Zachodniopomorskie	9,3
10. Podlaskie	6,5	10. Kujawsko-pomorskie	9,4
11. Pomorskie	9,5	11. Lubelskie	9,5
12. Śląskie	11,3	12. Pomorskie	9,5
13. Świętokrzyskie	9,7	13. Dolnośląskie	9,6
14. Warmińsko-mazurskie	5,6	14. Świętokrzyskie	9,7
15. Wielkopolskie	4,8	15. Lubuskie	10,2
16. Zachodniopomorskie	9,3	16. Śląskie	11,3

Tabela XLIII

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci potwierdzoną bakteriologicznie (bez wznów). Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by culture confirmed tuberculosis notification rates (without relapses).

Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	7,6	Polska	7,6
1. Dolnośląskie	8,1	1. Wielkopolskie	4,2
2. Kujawsko-pomorskie	8,2	2. Podlaskie	5,0
3. Lubelskie	8,3	3. Opolskie	5,1
4. Lubuskie	9,0	4. Warmińsko-mazurskie	5,5
5. Łódzkie	6,9	5. Podkarpackie	6,6
6. Małopolskie	8,1	6. Łódzkie	6,9
7. Mazowieckie	7,2	7. Mazowieckie	7,2
8. Opolskie	5,1	8. Dolnośląskie	8,1
9. Podkarpackie	6,6	9. Małopolskie	8,1
10. Podlaskie	5,0	10. Kujawsko-pomorskie	8,2
11. Pomorskie	8,7	11. Lubelskie	8,3
12. Śląskie	10,4	12. Zachodniopomorskie	8,4
13. Świętokrzyskie	8,5	13. Świętokrzyskie	8,5
14. Warmińsko-mazurskie	5,5	14. Pomorskie	8,7
15. Wielkopolskie	4,2	15. Lubuskie	9,0
16. Zachodniopomorskie	8,4	16. Śląskie	10,4

Tabela XLIV

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, z dodatnim wynikiem bakterioskopii. Polska 2025 rok. Współczynniki na 100.000 ludności.


Rank-list of voivodeships by notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis with positive sputum smear. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	5,4	POLSKA	5,4
1. Dolnośląskie	6,9	1. Wielkopolskie	3,1
2. Kujawsko-pomorskie	6,7	2. Warmińsko-mazurskie	3,2
3. Lubelskie	5,3	3. Łódzkie	4,1
4. Lubuskie	7,1	4. Podlaskie	4,2
5. Łódzkie	4,1	5. Opolskie	4,3
6. Małopolskie	6,6	6. Podkarpackie	4,6
7. Mazowieckie	4,6	7. Mazowieckie	4,6
8. Opolskie	4,3	8. Lubelskie	5,3
9. Podkarpackie	4,6	9. Świętokrzyskie	5,3
10. Podlaskie	4,2	10. Zachodniopomorskie	5,9
11. Pomorskie	6,1	11. Pomorskie	6,1
12. Śląskie	7,3	12. Małopolskie	6,6
13. Świętokrzyskie	5,3	13. Kujawsko-pomorskie	6,7
14. Warmińsko-mazurskie	3,2	14. Dolnośląskie	6,9
15. Wielkopolskie	3,1	15. Lubuskie	7,1
16. Zachodniopomorskie	5,9	16. Śląskie	7,3

Mapa 2

Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w 2025 roku wg województw.
Współczynniki na 100.000 ludności.

Notification rates of bacteriologically confirmed tuberculosis by voivodeships. Poland 2025. Rates per 100.000 population.



POLSKA - 8,2



< 8



8 – 11



> 11

Tabela XLV

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by notification rates of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	8,2	Polska	8,2
1. Dolnośląskie	9,2	1. Wielkopolskie	4,6
2. Kujawsko-pomorskie	9,1	2. Warmińsko-mazurskie	5,2
3. Lubelskie	9,3	3. Opolskie	5,7
4. Lubuskie	10,0	4. Podlaskie	6,3
5. Łódzkie	7,5	5. Podkarpackie	7,0
6. Małopolskie	8,9	6. Łódzkie	7,5
7. Mazowieckie	8,1	7. Mazowieckie	8,1
8. Opolskie	5,7	8. Małopolskie	8,9
9. Podkarpackie	7,0	9. Świętokrzyskie	8,9
10. Podlaskie	6,3	10. Kujawsko-pomorskie	9,1
11. Pomorskie	9,1	11. Pomorskie	9,1
12. Śląskie	11,1	12. Dolnośląskie	9,2
13. Świętokrzyskie	8,9	13. Zachodniopomorskie	9,2
14. Warmińsko-mazurskie	5,2	14. Lubelskie	9,3
15. Wielkopolskie	4,6	15. Lubuskie	10,0
16. Zachodniopomorskie	9,2	16. Śląskie	11,1

Tabela XLVI

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę pozapłucną w Polsce w roku 2025. Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by extrapulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	0,4	Polska	0,4
1. Dolnośląskie	0,7	1. Podlaskie	0,2
2. Kujawsko-pomorskie	0,4	2. Zachodniopomorskie	0,2
3. Lubelskie	0,4	3. Mazowieckie	0,3
4. Lubuskie	0,7	4. Wielkopolskie	0,3
5. Łódzkie	0,3	5. Podkarpackie	0,3
6. Małopolskie	0,4	6. Łódzkie	0,3
7. Mazowieckie	0,3	7. Śląskie	0,3
8. Opolskie	0,3	8. Opolskie	0,3
9. Podkarpackie	0,3	9. Lubelskie	0,4
10. Podlaskie	0,2	10. Kujawsko-pomorskie	0,4
11. Pomorskie	0,7	11. Małopolskie	0,4
12. Śląskie	0,3	12. Warmińsko-mazurskie	0,6
13. Świętokrzyskie	0,9	13. Pomorskie	0,7
14. Warmińsko-mazurskie	0,6	14. Dolnośląskie	0,7
15. Wielkopolskie	0,3	15. Lubuskie	0,7
16. Zachodniopomorskie	0,2	16. Świętokrzyskie	0,9

Rycina 9

Udział chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc wg województw. Polska 2025 rok.

Percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases in total PTB notified cases by voivodships. Poland 2025.




Tabela XLVII

Ranking województw wg udziału gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wśród chorych na gruźlicę. Polska 2025 rok.


Rank-list of bacteriologically voivodeships by percentage of confirmed tuberculosis cases in total registered TB cases. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw Rank-list	%
Polska	83,1%	Polska	83,1%
1. Dolnośląskie	87,3%	1. Wielkopolskie	94,4%
2. Kujawsko-pomorskie	89,8%	2. Mazowieckie	92,5%
3. Lubelskie	70,0%	3. Pomorskie	90,0%
4. Lubuskie	73,9%	4. Kujawsko-pomorskie	89,8%
5. Łódzkie	69,5%	5. Dolnośląskie	87,3%
6. Małopolskie	85,7%	6. Świętokrzyskie	86,2%
7. Mazowieckie	92,5%	7. Podlaskie	85,9%
8. Opolskie	69,2%	8. Zachodniopomorskie	85,8%
9. Podkarpackie	79,0%	9. Małopolskie	85,7%
10. Podlaskie	85,9%	10. Warmińsko-mazurskie	83,3%
11. Pomorskie	90,0%	11. Podkarpackie	79,0%
12. Śląskie	78,0%	12. Śląskie	78,0%
13. Świętokrzyskie	86,2%	13. Lubuskie	73,9%
14. Warmińsko-mazurskie	83,3%	14. Lubelskie	70,0%
15. Wielkopolskie	94,4%	15. Łódzkie	69,5%
16. Zachodniopomorskie	85,8%	16. Opolskie	69,2%

Mapa 3

Udział chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc wg województw. Polska 2025 rok.

Percentage of bacteriologically culture confirmed pulmonary tuberculosis cases in total registered pulmonary TB cases. Poland 2025.



POLSKA - 83,8%



< 80%



80%- 90%



> 90%

Tabela XLVIII

Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc. Polska 2025 rok.

Rank-list of voivodeships by percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases in total notified pulmonary cases. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw Rank-list	%
Polska	83,8%	Polska	83,8%
1. Dolnośląskie	88,8%	1. Wielkopolskie	94,6%
2. Kujawsko-pomorskie	90,4%	2. Mazowieckie	93,1%
3. Lubelskie	70,3%	3. Pomorskie	91,9%
4. Lubuskie	76,4%	4. Kujawsko-pomorskie	90,4%
5. Łódzkie	69,4%	5. Dolnośląskie	88,8%
6. Małopolskie	87,1%	6. Małopolskie	87,1%
7. Mazowieckie	93,1%	7. Zachodniopomorskie	86,6%
8. Opolskie	70,7%	8. Świętokrzyskie	85,8%
9. Podkarpackie	80,0%	9. Podlaskie	85,5%
10. Podlaskie	85,5%	10. Warmińsko-mazurskie	85,4%
11. Pomorskie	91,9%	11. Podkarpackie	80,0%
12. Śląskie	78,3%	12. Śląskie	78,3%
13. Świętokrzyskie	85,8%	13. Lubuskie	76,4%
14. Warmińsko-mazurskie	85,4%	14. Opolskie	70,7%
15. Wielkopolskie	94,6%	15. Lubelskie	70,3%
16. Zachodniopomorskie	86,6%	16. Łódzkie	69,4%

Tabela XLIX

Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie z dodatnim wynikiem bakterioskopii wśród ogółu chorych na gruźlicę płuc. Polska 2025 rok.

Rank-list of voivodeships by percentage of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis cases with positive sputum smear in total notified pulmonary cases. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw Rank-list	%
Polska	54,9%	Polska	54,9%
1. Dolnośląskie	66,8%	1. Dolnośląskie	66,8%
2. Kujawsko-pomorskie	66,7%	2. Kujawsko-pomorskie	66,7%
3. Lubelskie	39,9%	3. Małopolskie	64,3%
4. Lubuskie	54,3%	4. Wielkopolskie	64,3%
5. Łódzkie	37,7%	5. Pomorskie	61,5%
6. Małopolskie	64,3%	6. Podlaskie	56,6%
7. Mazowieckie	53,2%	7. Zachodnio-pomorskie	55,8%
8. Opolskie	53,3%	8. Lubuskie	54,3%
9. Podkarpackie	52,2%	9. Opolskie	53,3%
10. Podlaskie	56,6%	10. Mazowieckie	53,2%
11. Pomorskie	61,5%	11. Warmińsko-mazurskie	52,4%
12. Śląskie	51,6%	12. Podkarpackie	52,2%
13. Świętokrzyskie	50,8%	13. Śląskie	51,6%
14. Warmińsko-mazurskie	52,4%	14. Świętokrzyskie	50,8%
15. Wielkopolskie	64,3%	15. Lubelskie	39,9%
16. Zachodniopomorskie	55,8%	16. Łódzkie	37,7%

Tabela L

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce w 2025 roku. Współczynnik na 100.000 dzieci.

Rank-list of voivodeships by pediatric tuberculosis notification rates. Poland 2025. Rates per 100.000 children.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	1,2	Polska	1,2
1. Dolnośląskie	0,3	1. Podlaskie	-
2. Kujawsko-pomorskie	1,4	2. Dolnośląskie	0,3
3. Lubelskie	1,1	3. Podkarpackie	0,3
4. Lubuskie	5,9	4. Śląskie	0,3
5. Łódzkie	0,9	5. Wielkopolskie	0,4
6. Małopolskie	2,3	6. Zachodnio-pomorskie	0,5
7. Mazowieckie	0,8	7. Mazowieckie	0,8
8. Opolskie	0,8	8. Opolskie	0,8
9. Podkarpackie	0,3	9. Łódzkie	0,9
10. Podlaskie	-	10. Lubelskie	1,1
11. Pomorskie	3,5	11. Warmińsko-mazurskie	1,1
12. Śląskie	0,3	12. Kujawsko-pomorskie	1,4
13. Świętokrzyskie	2,7	13. Małopolskie	2,3
14. Warmińsko-mazurskie	1,1	14. Świętokrzyskie	2,7
15. Wielkopolskie	0,4	15. Pomorskie	3,5
16. Zachodniopomorskie	0,5	16. Lubuskie	5,9

Tabela LI

Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci u młodzieży (15-19 lat) w Polsce w 2025 roku. Współczynnik na 100.000 młodocianych.

Rank-list of voivodeships by tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old). Poland 2025. Rates per 100.000 adolescents.

Województwa Voivodeships	Współczynniki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynniki Rates
Polska	3,5	Polska	3,5
1. Dolnośląskie	2,2	1. Podlaskie	-
2. Kujawsko-pomorskie	7,5	2. Małopolskie	0,6
3. Lubelskie	6,6	3. Podkarpackie	0,9
4. Lubuskie	5,7	4. Warmińsko-mazurskie	1,3
5. Łódzkie	6,0	5. Mazowieckie	2,1
6. Małopolskie	0,6	6. Dolnośląskie	2,2
7. Mazowieckie	2,1	7. Opolskie	2,3
8. Opolskie	2,3	8. Śląskie	2,8
9. Podkarpackie	0,9	9. Świętokrzyskie	3,4
10. Podlaskie	-	10. Wielkopolskie	4,2
11. Pomorskie	5,4	11. Pomorskie	5,4
12. Śląskie	2,8	12. Lubuskie	5,7
13. Świętokrzyskie	3,4	13. Łódzkie	6,0
14. Warmińsko-mazurskie	1,3	14. Lubelskie	6,6
15. Wielkopolskie	4,2	15. Kujawsko-pomorskie	7,5
16. Zachodniopomorskie	8,4	16. Zachodniopomorskie	8,4

Rycina 10

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci ogółem, dzieci i młodocianych w Polsce w latach 1957-2025. Współczynniki na 100.000 ludności.
Tuberculosis notification rates –children, adolescents and total population. Poland 1957 – 2025. Rates per 100.000.




Tabela LII

Ranking województw wg udziału (w %) ponownych zachorowań (wznów) wśród ogółu chorych na gruźlicę zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku.

Rank-list of voivodeships by percentage of relapses in total tuberculosis notified cases. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw Rank-list	%
Polska	11,9%	Polska	11,9%
1. Dolnośląskie	16,5%	1. Podlaskie	22,4%
2. Kujawsko-pomorskie	11,2%	2. Lubelskie	17,0%
3. Lubelskie	17,0%	3. Opolskie	16,7%
4. Lubuskie	9,7%	4. Dolnośląskie	16,5%
5. Łódzkie	9,7%	5. Wielkopolskie	12,4%
6. Małopolskie	11,3%	6. Świętokrzyskie	12,3%
7. Mazowieckie	12,2%	7. Mazowieckie	12,2%
8. Opolskie	16,7%	8. Małopolskie	11,3%
9. Podkarpackie	9,1%	9. Kujawsko-pomorskie	11,2%
10. Podlaskie	22,4%	10. Śląskie	10,8%
11. Pomorskie	8,4%	11. Lubuskie	9,7%
12. Śląskie	10,8%	12. Zachodniopomorskie	9,7%
13. Świętokrzyskie	12,3%	13. Łódzkie	9,7%
14. Warmińsko-mazurskie	3,3%	14. Podkarpackie	9,1%
15. Wielkopolskie	12,4%	15. Pomorskie	8,4%
16. Zachodniopomorskie	9,7%	16. Warmińsko-mazurskie	3,3%

Tabela LIII

Gruźlica wśród obywateli cudzoziemskich zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku wg płci, wieku i historii poprzedniego leczenia.
Foreign origin tuberculosis cases registered in Poland in 2025 by sex, age groups and history of previous treatment.

Historia poprzedniego leczenia/ płeć		Grupy wieku – Age groups					
		0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total
Nowe zachor. New cases	M – M	4	3	157	70	4	238
	K – F	1	2	55	20	2	80
	R – T	5	5	212	90	6	318
Wznowy Relapse	M – M	-	-	18	6	1	25
	K – F	-	-	4	2	-	6
	R – T	-	-	22	8	1	31
Ogółem Total	M – M	4	3	175	76	5	263
	K – F	1	2	59	22	2	86
	R – T	5	5	234	98	7	349

Tabela LIV

Gruźlica wśród obywateli cudzoziemskich zarejestrowanych w Polsce w 2025 roku wg wieku i stanu bakteriologicznego.

Foreign origin tuberculosis cases registered in Poland in 2025 by age groups and bacteriological status.

Historia poprzedniego leczenia/ stan bakteriologiczny		Grupy wieku – Age groups					
		0-14	15-19	20-44	45-64	65+	Razem Total
Nowe zachor. New cases	P/conf	2	3	184	83	5	277
	N/conf	3	2	28	7	1	41
	R - T	5	5	212	90	6	318
Wznowy Relapse	P/conf	-	-	19	7	1	27
	N/conf	-	-	3	1	-	4
	R - T	-	-	22	8	1	31
Ogółem Total	P/conf	2	3	203	90	6	304
	N/conf	3	2	31	8	1	45
	R - T	5	5	234	98	7	349

P/conf – potwierdzony bakteriologicznie

N/conf – niepotwierdzony bakteriologicznie

Rycina 11

Struktura kliniczna zachorowań na gruźlicę w Polsce w 2025 roku.

Clinical profile of tuberculosis cases. Poland 2025.




Tabela LV

Udział (w %) ostrych postaci gruźlicy w ogólnej zapadalności na gruźlicę w Polsce w 2025 roku wg województw.

Percentage of acute severe forms of tuberculosis cases in total tuberculosis cases by voivodeships. Poland 2025

Województwa Voivodeships	Gruźlica prosówkowa płuc ostra Acute miliary pulm.TB		Gruźlicze zapalenie opon mózg. Mening.TB	
	Liczba Number	%	Liczba Number	%
Polska	10	0,3%	4	0,1%
1. Dolnośląskie	2	0,6%	1	0,3%
2. Kujawsko-pomorskie	-	-	-	-
3. Lubelskie	1	0,4%	-	-
4. Lubuskie	2	1,5%	-	-
5. Łódzkie	-	-	-	-
6. Małopolskie	-	-	-	-
7. Mazowieckie	1	0,2%	-	-
8. Opolskie	1	1,3%	-	-
9. Podkarpackie	-	-	-	-
10. Podlaskie	-	-	-	-
11. Pomorskie	1	0,4%	-	-
12. Śląskie	-	-	-	-
13. Świętokrzyskie	1	0,8%	1	0,8%
14. Warmińsko-mazurskie	1	1,1%	-	-
15. Wielkopolskie	-	-	-	-
16. Zachodniopomorskie	-	-	2	1,1%

Tabela LVI

Chorzy z lekoopornością prątków zarejestrowani wg województw w Polsce na dzień 31 XII 2025 (chorobowość wg sprawozdania MZ-13).

Antituberculous drug resistant cases by voivodeships. Poland 2025 (prevalence).

Województwa Voivodeships	Liczba lekoopornych na co najmniej 1lek p/prątkowy /Cases resistant to at least one antiTB drug/	Województwa Voivodeships	Liczba chorych z wielolekoopornością MDR-TB
Polska	259	Polska	185
1. Dolnośląskie	34	1. Dolnośląskie	17
2. Kujawsko-pomorskie	2	2. Kujawsko-pomorskie	-
3. Lubelskie	2	3. Lubelskie	2
4. Lubuskie	-	4. Lubuskie	-
5. Łódzkie	18	5. Łódzkie	3
6. Małopolskie	22	6. Małopolskie	7
7. Mazowieckie	28	7. Mazowieckie	24
8. Opolskie	-	8. Opolskie	-
9. Podkarpackie	9	9. Podkarpackie	5
10. Podlaskie	2	10. Podlaskie	-
11. Pomorskie	77	11. Pomorskie	77
12. Śląskie	10	12. Śląskie	6
13. Świętokrzyskie	2	13. Świętokrzyskie	1
14. Warmińsko-mazurskie	18	14. Warmińsko-mazurskie	18
15. Wielkopolskie	-	15. Wielkopolskie	-
16. Zachodniopomorskie	35	16. Zachodniopomorskie	25

Tabela LVII

Umieralność z powodu gruźlicy wszystkich postaci w Polsce wg grup wieku w latach 1950-2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from tuberculosis (all forms) by age groups. Poland 1950-2024. Rates per 100.000 population.

Rok	W grupach wieku / Age groups						W grupach wieku / Age groups					
	Razem/Total	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65+	Razem/Total	0 - 14	15 - 19	20 - 44	45 - 64	65+
	Liczby bezwzględne / Numbers						Współczynniki / Rates					
1950	26.265	3.056	1.647	12.070	7.727	1.765	105,8	41,9	68,3	128,5	174,5	135,9
1955	14.828	1.413	365	5.164	6.012	1.874	54,4	16,7	15,9	52,4	115,8	125,4
1960	11.602	408	85	3.562	5.371	2.176	39,2	4,1	4,4	35,0	92,2	127,6
1965	11.768	120	35	2.539	5.312	3.762	37,4	1,2	1,2	23,5	90,2	175,3
1970	8.306	38	21	1.131	3.313	3.803	25,3	0,4	0,6	9,7	53,4	140,2
1975	4.372	16	8	440	1.539	2.369	12,9	0,2	0,2	3,5	23,0	73,0
1980	2.945	3	3	352	1.070	1.517	8,3	0,0	0,1	2,6	15,0	42,2
1985	2.005	4	-	222	782	997	5,4	0,0	-	1,6	10,1	28,5
1990	1.349	1	2	166	542	638	3,5	0,0	0,1	1,2	7,2	16,6
1995	1.130	1	-	195	467	467	2,9	0,0	-	1,4	5,9	10,9
2000	1.041	-	-	138	417	486	2,7	-	-	1,0	4,7	10,3
2010	575	-	-	79	284	212	1,5	-	-	0,6	2,7	4,1
2012	630	-	-	69	322	239	1,6	-	-	0,5	3,0	4,4
2013	532	-	1	60	266	205	1,4	-	0,0	0,4	2,5	3,7
2014	526	-	1	53	252	220	1,4	-	0,0	0,4	2,4	3,8
2015	537	-	-	91	249	197	1,4	-	-	0,6	2,4	3,3
2016	543	1	-	92	244	206	1,4	0,0	-	0,6	2,4	3,3
2017	490	-	-	70	223	197	1,3	-	-	0,5	2,2	3,1
2018	519	-	-	65	257	197	1,4	-	-	0,5	2,5	3,0
2019	456	-	-	61	211	184	1,2	-	-	0,4	2,1	2,7
2020	474	-	-	57	228	189	1,2	-	-	0,4	2,3	2,7
2021	440	-	-	84	215	141	1,2	-	-	0,6	2,2	2,0
2022	472	-	1	78	233	160	1,2	-	0,1	0,6	2,4	2,2
2023	483	1	-	77	220	185	1,3	0,0	-	0,6	2,2	2,5
2024	448	-	-	59	205	184	1,2	-	-	0,5	2,1	2,4

Rycina 12

Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce w latach 1965-2024. Współczynniki na 100.000 ludności. Mortality from tuberculosis (all forms) in Poland 1965-2024. Rates per 100.000 population.




Tabela LVIII

Umieralność z powodu gruźlicy wg lokalizacji zmian, wieku, płci i miejsca zamieszkania w Polsce w 2024 roku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from pulmonary and extrapulmonary tuberculosis by age groups, sex and place of residence. Poland 2024. Rates per 100.000 population.

	Gruźlica (TB)					
	Liczba zgonów / Number of deaths			Współczynniki / Rates		
	Płuc Pulm. TB	Pozapłucna Extrapulm.	Razem Total	Płuc Pulm. TB	Pozapłucna Extrapulm.	Razem Total
Ogółem	437	11	448	1,2	0,0	1,2
0-14	-	-	-	-	-	-
15-19	-	-	-	-	-	-
20-44	58	1	59	0,5	0,0	0,5
45-64	202	3	205	2,0	0,0	2,1
65+	177	7	184	2,3	0,1	2,4
Mężczyźni Male	356	8	364	2,0	0,0	2,0
Kobiety Female	81	3	84	0,4	0,0	0,4
Miasto Urban area	271	6	277	1,2	0,0	1,2
Wieś Rural area	166	5	171	1,1	0,0	1,1

Tabela LIX

Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce wg płci, miejsca zamieszkania i województw w 2024 roku. Współczynniki na 100.000 ludności.
Mortality from tuberculosis (all forms) by sex, place of residence and voivodeships. Poland 2024. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Ogółem Total		Mężczyźni Male		Kobiety Female		Miasto Urban areas		Wieś Rural areas	
	Liczba Number	Wsp. Rate	Liczba Number	Wsp. Rate	Liczba Number	Wsp. Rate	Liczba Number	Wsp. Rate	Liczba Number	Wsp. Rate
O G Ó Ł E M	448	1,2	364	2,0	84	0,4	277	1,2	171	1,1
1. Dolnośląskie	26	0,9	21	1,5	5	0,3	16	0,8	10	1,1
2. Kujaw.-pomorskie	26	1,3	23	2,4	3	0,3	18	1,6	8	1,0
3. Lubelskie	28	1,4	21	2,2	7	0,7	15	1,6	13	1,2
4. Lubuskie	10	1,0	9	1,9	1	0,2	9	1,4	1	0,3
5. Łódzkie	23	1,0	19	1,7	4	0,3	14	1,0	9	1,0
6. Małopolskie	20	0,6	15	0,9	5	0,3	9	0,5	11	0,6
7. Mazowieckie	68	1,2	56	2,1	12	0,4	37	1,0	31	1,6
8. Opolskie	8	0,9	8	1,8	-	-	3	0,6	5	1,1
9. Podkarpackie	17	0,8	14	1,4	3	0,3	6	0,7	11	0,9
10. Podlaskie	11	1,0	9	1,6	2	0,3	4	0,6	7	1,6
11. Pomorskie	33	1,4	28	2,4	5	0,4	21	1,4	12	1,3
12. Śląskie	98	2,3	81	3,9	17	0,8	80	2,5	18	1,7
13. Świętokrzyskie	11	0,9	7	1,2	4	0,7	3	0,6	8	1,3
14. Warmińsko-mazurskie	22	1,6	12	1,8	10	1,4	14	1,8	8	1,4
15. Wielkopolskie	27	0,8	23	1,4	4	0,2	17	0,9	10	0,6
16. Zachodniopomorskie	20	1,2	18	2,3	2	0,2	11	1,0	9	1,7

Tabela LX

Umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2020-2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from tuberculosis (all forms) by voivodeships. Poland 2020-2024. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Liczby/ Numbers					Współczynniki/ Rates				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
POLSKA	474	440	472	483	448	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2
1. Dolnośląskie	44	41	47	32	26	1,5	1,4	1,6	1,1	0,9
2. Kujawsko-pomorskie	15	17	19	22	26	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3
3. Lubelskie	29	39	33	35	28	1,4	1,9	1,6	1,7	1,4
4. Lubuskie	4	6	11	18	10	0,4	0,6	1,1	1,8	1,0
5. Łódzkie	30	21	27	22	23	1,2	0,9	1,1	0,9	1,0
6. Małopolskie	43	34	41	21	20	1,3	1,0	1,2	0,6	0,6
7. Mazowieckie	65	55	70	71	68	1,2	1,0	1,3	1,3	1,2
8. Opolskie	10	13	6	12	8	1,0	1,3	0,6	1,3	0,9
9. Podkarpackie	24	17	29	16	17	1,1	0,8	1,4	0,8	0,8
10. Podlaskie	9	8	7	4	11	0,8	0,7	0,6	0,4	1,0
11. Pomorskie	21	27	23	29	33	0,9	1,2	1,0	1,2	1,4
12. Śląskie	83	80	89	111	98	1,8	1,8	2,0	2,6	2,3
13. Świętokrzyskie	23	12	10	22	11	1,9	1,0	0,8	1,9	0,9
14. Warmińsko-mazurskie	17	19	12	21	22	1,2	1,3	0,9	1,5	1,6
15. Wielkopolskie	29	25	26	25	27	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8
16. Zachodniopomorskie	28	26	22	22	20	1,7	1,5	1,3	1,3	1,2

Tabela LXI

Ranking województw wg umieralności z powodu gruźlicy w Polsce w roku 2024 Współczynniki na 100.000 ludności.

Rank-list of voivodeships by mortality from tuberculosis (all forms). Poland 2024. Rates per 100.000 population.

Województwa Voivodeships	Współczyn niki Rates	Ranking województw Rank-list	Współczynni ki Rates
POLSKA	1,2	POLSKA	1,2
1. Dolnośląskie	0,9	1. Śląskie	2,3
2. Kujawsko-pomorskie	1,3	2. Warmińsko-mazurskie	1,6
3. Lubelskie	1,4	3. Pomorskie	1,4
4. Lubuskie	1,0	4. Lubelskie	1,4
5. Łódzkie	1,0	5. Kujawsko-pomorskie	1,3
6. Małopolskie	0,6	6. Mazowieckie	1,2
7. Mazowieckie	1,2	7. Zachodniopomorskie	1,2
8. Opolskie	0,9	8. Lubuskie	1,0
9. Podkarpackie	0,8	9. Łódzkie	1,0
10. Podlaskie	1,0	10. Podlaskie	1,0
11. Pomorskie	1,4	11. Świętokrzyskie	0,9
12. Śląskie	2,3	12. Dolnośląskie	0,9
13. Świętokrzyskie	0,9	13. Opolskie	0,9
14. Warmińsko-mazurskie	1,6	14. Podkarpackie	0,8
15. Wielkopolskie	0,8	15. Wielkopolskie	0,8
16. Zachodniopomorskie	1,2	16. Małopolskie	0,6

Tabela LXII

Stopień objęcia szczepieniami BCG noworodków w Polsce w roku w 2025 wg województw (%).

BCG vaccination coverage of newborns by voivodeships. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw	%
POLSKA	92,0	POLSKA	92,0
1. Dolnośląskie	90,1	1. Mazowieckie	94,7
2. Kujawsko-pomorskie	93,7	2. Wielkopolskie	94,4
3. Lubelskie	89,1	3. Łódzkie	94,0
4. Lubuskie	91,0	4. Kujawsko-Pomorskie	93,7
5. Łódzkie	94,0	5. Warmińsko-Mazurskie	92,8
6. Małopolskie	89,6	6. Zachodniopomorskie	92,0
7. Mazowieckie	94,7	7. Opolskie	91,2
8. Opolskie	91,2	8. Lubuskie	91,0
9. Podkarpackie	90,5	9. Świętokrzyskie	90,8
10. Podlaskie	90,5	10. Śląskie	90,8
11. Pomorskie	90,3	11. Podkarpackie	90,5
12. Śląskie	90,8	12. Podlaskie	90,5
13. Świętokrzyskie	90,8	13. Pomorskie	90,3
14. Warmińsko-mazurskie	92,8	14. Dolnośląskie	90,1
15. Wielkopolskie	94,4	15. Małopolskie	89,6
16. Zachodniopomorskie	92,0	16. Lubelskie	89,1

Tabela LXIII

Ranking województw wg udziału (w %) chorych na gruźlicę płuc wykrytych z objawów chorobowych w Polsce w 2025 roku.


Rank-list of voivodeships by percentage of pulmonary TB cases detected by symptoms. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	%	Ranking województw Rank-list	%
Polska	93,2%	Polska	93,2%
1. Dolnośląskie	85,1%	1. Podkarpackie	99,4%
2. Kujawsko-pomorskie	89,9%	2. Zachodniopomorskie	98,8%
3. Lubelskie	97,0%	3. Świętokrzyskie	98,3%
4. Lubuskie	86,6%	4. Wielkopolskie	97,0%
5. Łódzkie	95,2%	5. Lubelskie	97,0%
6. Małopolskie	91,7%	6. Podlaskie	96,4%
7. Mazowieckie	88,7%	7. Warmińsko-mazurskie	96,3%
8. Opolskie	77,3%	8. Śląskie	95,9%
9. Podkarpackie	99,4%	9. Pomorskie	95,7%
10. Podlaskie	96,4%	10. Łódzkie	95,2%
11. Pomorskie	95,7%	11. Małopolskie	91,7%
12. Śląskie	95,9%	12. Kujawsko-pomorskie	89,9%
13. Świętokrzyskie	98,3%	13. Mazowieckie	88,7%
14. Warmińsko-mazurskie	96,3%	14. Lubuskie	86,6%
15. Wielkopolskie	97,0%	15. Dolnośląskie	85,1%
16. Zachodniopomorskie	98,8%	16. Opolskie	77,3%

Rycina 13

Metody wykrywania chorych na gruźlicę układu oddechowego / płuc w Polsce w latach 1970-2025.

Methods of case finding of respiratory / pulmonary tuberculosis, Poland 1970-2025.



* Do 2000 roku badania radiofotograficzne/Until 2000 – MMR

Tabela LXIV

Ranking województw wg udziału chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną oraz niepotwierdzoną bakteriologicznie, wykrytych z objawów chorobowych (wśród - odpowiednio - wszystkich chorych na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie lub wszystkich chorych na gruźlicę płuc niepotwierdzoną bakteriologicznie) w Polsce w 2025 roku.

Rank-list of voivodeships by percentage of pulmonary TB cases detected by symptoms in culture positive and culture negative pulmonary TB cases. Poland 2025.

Województwa Voivodeships	culture+	culture(-)	Ranking województw Rank-list	culture+	Ranking województw Rank-list	culture (-)
Polska	94,8%	84,6%	Polska	94,8%	Polska	84,6%
1. Dolnośląskie	89,7%	48,5%	1. Warmińsko-mazurskie	100,0%	1. Podkarpackie	100,0%
2. Kujawsko-pomorskie	93,9%	52,6%	2. Zachodnio-pomorskie	99,3%	2. Podlaskie	100,0%
3. Lubelskie	96,2%	98,7%	3. Podkarpackie	99,3%	3. Wielkopolskie	100,0%
4. Lubuskie	92,8%	66,7%	4. Pomorskie	99,1%	4. Lubelskie	98,7%
5. Łódzkie	96,0%	93,5%	5. Świętokrzyskie	99,0%	5. Śląskie	97,7%
6. Małopolskie	93,8%	77,8%	6. Wielkopolskie	96,9%	6. Zachodnio-pomorskie	95,7%
7. Mazowieckie	91,0%	57,6%	7. Lubelskie	96,2%	7. Świętokrzyskie	94,1%
8. Opolskie	86,8%	54,5%	8. Łódzkie	96,0%	8. Łódzkie	93,5%
9. Podkarpackie	99,3%	100,0%	9. Podlaskie	95,8%	9. Małopolskie	77,8%
10. Podlaskie	95,8%	100,0%	10. Śląskie	95,4%	10. Warmińsko-mazurskie	75,0%
11. Pomorskie	99,1%	57,9%	11. Kujawsko-pomorskie	93,9%	11. Lubuskie	66,7%
12. Śląskie	95,4%	97,7%	12. Małopolskie	93,8%	12. Pomorskie	57,9%
13. Świętokrzyskie	99,0%	94,1%	13. Lubuskie	92,8%	13. Mazowieckie	57,6%
14. Warmińsko-mazurskie	100,0%	75,0%	14. Mazowieckie	91,0%	14. Opolskie	54,5%
15. Wielkopolskie	96,9%	100,0%	15. Dolnośląskie	89,7%	15. Kujawsko-pomorskie	52,6%
16. Zachodniopomorskie	99,3%	95,7%	16. Opolskie	86,8%	16. Dolnośląskie	48,5%

07

UMIERALNOŚĆ Z POWODU WYBRANYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

Tabela LXV

Umieralność z powodu wybranych przyczyn w Polsce w latach: 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality by selected causes. Poland 2010, 2020, 2023, 2024. Rates per 100.000 population.

Przyczyna zgonu (Deaths by causes)	2010		2020		2023		2024	
	Liczb N.	Współ. R.	Liczb N.	Współ. R.	Liczb N.	Współ. R.	Liczb N.	Współ. R.
Zgony z powodu wszystkich przyczyn (Death from all causes)	378.478	991,1	477.355	1244,6	409.036	1085,0	408.504	1092,2
Gruźlica ogółem (A15-A19) (Tuberculosis total)	575	1,5	474	1,2	483	1,3	448	1,2
<u>w tym:</u> gruźlica płuc (A15-A16) (Pulmonary TB)	555	1,5	462	1,2	465	1,2	437	1,2
Nowotwory ogółem (C00-D48) (Cancer total)	96.066	251,6	108.698	283,4	109.226	289,7	110.289	294,9
<u>w tym:</u> nowotwory układu oddechowego (C30-C34) (Cancer of respiratory tract)	24.049	63,0	24.007	62,6	23.779	63,1	23.452	62,7
Choroby układu krążenia (I00-I99) (Cardiovascular diseases)	174.003	455,7	174.546	455,1	150.957	404,4	150.325	401,9
Choroby układu oddechowego (J00-J99) (Respiratory diseases)	19.333	50,6	28.732	74,9	30.382	80,6	31.821	85,1
Choroby układu trawiennego (K00-K93) (Digestive tract diseases)	16.235	42,5	18.811	49,0	19.943	5,9	19.643	52,5
Wypadki i zatrucia (V01-Y98) (Accidents and poisonings)	23.626	61,9	20.283	52,9	19.645	52,1	18.532	49,5

Tabela LXVI

Umieralność z powodu chorób układu oddechowego wg wybranych przyczyn w Polsce w latach 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from selected respiratory diseases – Poland 2010,2020,2023, 2024.Rates per 100.000 population.

PRZYCZYNY ZGONU Causes of death	2010		2020		2023		2024	
	Liczby N.	Współ. R.	Liczby N.	Współ. R.	Liczby N.	Współ. R.	Liczby N.	Współ. R.
Choroby układu oddechowego łącznie z gruźlicą i nowotworami układu oddechowego Respiratory diseases – total (including pulmonary tuberculosis, cor pulmonale and cancer of respiratory organs)	44.499	116,5	54.325	141,6	55.502	147,2	56.111	150,0
<u>z tego (of which):</u>								
- gruźlica układu oddechowego (pulmonary TB) A15-A16	555	1,5	462	1,2	465	1,2	437	1,2
- nowotwory narządów oddechowych (cancer of respiratory organs) C30-C34	24.049	63,0	24.007	62,6	23.779	63,1	23.452	62,7
- zespół serca płucnego cor pulmonale syndrom I-27	562	1,5	1.124	2,9	876	2,3	401	1,1
- choroby układu oddechowego (respiratory diseases) J00-J99	19.333	50,6	28.732	74,9	30.382	80,6	31.821	85,1
<u>w tym:</u> - ostre zapalenie górnych dróg oddechowych (acute respiratory infections) J00-J06	6	0,0	12	0,0	46	0,1	29	0,1
- zapalenie płuc (pneumonia) J12-J18	9.549	25,0	19.770	51,5	19.976	53,0	21.537	57,6
- grypa (influenza) J10 – J11	28	0,1	143	0,4	431	1,1	564	1,5
Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych Chronic lower respir. tract. dis. J40 – J44	6.723	17,6	6.102	15,9	5359	14,2	5.679	15,2
Astma/ asthma J45 – J46	422	1,1	613	1,6	557	1,5	468	1,3

Tabela LXVII

Umieralność z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40 - J44) i astmy oskrzelowej w Polsce w latach 2010, 2020, 2023, 2024. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from chronic lower respiratory tract diseases (J40-J44) and asthma. Poland 2010, 2020, 2023, 2024. Rates per 100.000 population.

Przyczyny zgonu Causes of death	2010			2020			2023			2024		
	Liczby N.	Współ. R.	%	Liczby N.	Współ. R.	%	Liczby N.	Współ. R.	%	Liczby N.	Współ. R.	%
przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40 – J44 chronic lower respir. tract. dis.	6.723	17,6	94,1	6.102	15,9	90,9%	5.359	14,2	90,6%	5.679	15,1	92,4%
<u>w tym:</u> przewlekłe zapalenie oskrzeli i POCHP J41,42, J44 chronic bronchitis and COPD	6.660	17,4	93,2	6.023	15,7	89,7%	5.272	14,0	89,1%	5.579	14,9	90,8%
rozedma płuc J43 emphysema	58	0,2	0,8	77	0,2	1,1%	79	0,2	1,3%	89	0,2	1,4%
zapalenie oskrzeli nieostre i nieprzewlekłe J40 bronchitis not spec. as acute or chronic	5	0,0	0,1	2	0,0	0,0%	8	0,0	0,1%	11	0,0	0,2%
astma oskrzelowa J45-J46 asthma	422	1,1	5,9	613	1,6	9,1%	557	1,5	9,4%	468	1,2	7,6%

Tabela LVIII

Umieralność z powodu zapalenia płuc (J12-J18) w Polsce w latach 1970 – 2024 w wybranych grupach wieku wg płci. Współczynniki na 100.000 ludności.
Mortality from pneumonia by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000 population.

Rok	Płeć	Wiek	Ogółem Total	< 1	1 - 9	10 - 19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	≥70
1970	Mężcz.	M	31,2	701,2	6,7	1,8	2,0	2,9	7,9	22,7	67,7	258,9
	Kobiety	F	26,9	551,1	6,9	1,4	1,9	2,2	4,1	11,3	39,7	194,4
	Razem	T	29,0	628,2	6,8	1,6	2,0	2,6	5,9	16,5	52,0	217,7
1980	Mężcz.	M	23,6	181,7	1,9	1,2	1,4	3,2	8,6	17,4	54,6	234,2
	Kobiety	F	20,1	153,6	2,6	1,0	1,3	1,8	3,8	8,0	25,1	162,9
	Razem	T	21,8	184,1	3,3	1,2	1,7	2,5	6,2	12,3	38,1	189,1
1990	Mężcz.	M	16,2	78,3	1,4	0,9	1,6	3,5	6,6	15,5	33,0	197,7
	Kobiety	F	14,0	69,5	1,3	0,5	1,0	1,5	2,8	6,1	16,0	126,4
	Razem	T	15,1	74,0	1,4	0,7	1,3	2,5	4,7	10,6	23,3	151,5
2000	Mężcz.	M	21,6	24,9	1,2	0,9	1,0	2,9	7,8	12,5	40,6	253,1
	Kobiety	F	23,0	18,3	0,5	0,5	0,6	1,4	2,1	6,0	17,7	198,0
	Razem	T	22,3	21,7	0,9	0,6	0,9	2,1	5,0	9,1	27,8	217,6
2010	Mężcz.	M	27,7	12,0	1,0	1,0	1,6	3,5	9,2	20,3	41,0	254,1
	Kobiety	F	22,5	7,9	1,3	0,7	1,0	1,3	2,6	6,9	13,1	154,5
	Razem	T	25,0	10,1	1,2	0,8	1,3	2,4	5,9	13,4	25,6	190,1
2020	Mężcz.	M	58,5	9,8	0,3	1,2	2,1	5,7	14,1	31,5	86,9	433,0
	Kobiety	F	45,0	4,6	0,6	0,6	1,3	2,2	4,1	10,8	30,0	264,3
	Razem	T	51,5	7,2	0,5	0,9	1,7	4,0	9,2	21,0	56,1	327,2
2021	Mężcz.	M	53,3	9,2	1,5	0,7	2,2	5,8	13,2	29,0	83,7	374,6
	Kobiety	F	43,1	13,9	0,5	0,9	1,0	1,8	3,5	9,9	31,6	245,3
	Razem	T	48,0	11,5	1,0	0,8	1,7	3,8	8,3	19,3	55,5	293,6
2022	Mężcz.	M	56,9	10,1	1,1	1,6	3,9	6,8	14,3	30,6	86,8	389,9
	Kobiety	F	47,6	7,8	1,3	1,2	2,0	2,5	4,0	8,7	32,7	267,2
	Razem	T	52,1	9,2	1,2	1,4	3,0	4,7	9,2	19,5	57,5	313,3
2023	Mężcz.	M	56,5	15,6	1,0	0,9	2,9	5,7	10,9	27,3	78,7	390,7
	Kobiety	F	49,7	8,6	1,3	0,9	1,6	2,0	4,0	9,1	32,6	272,3
	Razem	T	53,0	12,2	1,1	0,9	2,2	3,9	7,5	18,0	53,8	317,1
2024	Mężcz.	M	62,0	15,8	0,9	1,2	2,9	6,2	13,4	30,5	86,2	407,1
	Kobiety	F	52,9	10,4	0,9	0,7	1,0	1,7	4,0	9,6	32,5	282,9
	Razem	T	57,3	13,2	0,9	0,9	1,9	4,0	8,8	19,9	57,3	330,1

Tabela LXIX

Umieralność z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych (J40-J44) w Polsce w latach 1970 – 2024 wg płci i wieku.

Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from chronic lower respiratory tract diseases (J40-J44) by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000 population.

Rok	Wiek		Ogółem	< 20	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	≥70
1970	Mężcz.	M	22,7	1,3	0,3	0,9	3,4	26,1	111,4	323,8
	Kobiety	F	9,9	0,6	0,2	0,2	0,9	5,0	23,5	120,3
	Razem	T	16,1	1,0	0,2	0,5	2,1	14,6	62,1	194,1
1990	Mężcz.	M	25,7	0,1	0,1	0,5	3,2	26,6	100,4	331,2
	Kobiety	F	8,7	0,1	0,2	0,4	1,1	5,4	19,5	76,4
	Razem	T	17,0	0,1	0,1	0,4	2,1	15,5	54,3	166,1
2000	Mężcz.	M	23,7	0,1	0,1	0,3	1,5	13,5	82,1	266,6
	Kobiety	F	8,5	0,0	0,0	0,0	0,6	5,3	16,5	62,3
	Razem	T	15,9	0,0	0,0	0,2	1,1	9,2	45,3	135,0
2010	Mężcz.	M	25,1	-	0,1	0,1	1,7	12,5	51,1	251,2
	Kobiety	F	10,6	-	-	0,1	0,4	4,7	19,5	63,6
	Razem	T	17,6	-	0,0	0,1	1,1	8,4	33,7	130,6
2020	Mężcz.	M	20,5	-	-	0,2	1,0	6,3	37,0	160,8
	Kobiety	F	11,6	-	-	0,0	0,2	3,6	17,8	67,6
	Razem	T	15,9	-	-	0,1	0,6	4,9	26,6	97,3
2022	Mężcz.	M	18,1	-	0,0	0,2	0,8	5,7	35,4	131,3
	Kobiety	F	11,8	-	-	-	0,3	1,7	17,6	60,2
	Razem	T	14,9	-	0,0	0,1	0,6	3,7	25,8	86,8
2023	Mężcz.	M	16,9	-	0,0	0,1	0,7	5,3	31,9	118,8
	Kobiety	F	11,7	-	-	0,1	0,2	2,4	16,5	57,8
	Razem	T	14,2	-	0,0	0,1	0,5	3,9	23,6	80,8
2024	Mężcz.	M	17,8	-	0,1	0,1	0,8	5,4	31,6	121,4
	Kobiety	F	12,6	-	-	0,1	0,4	1,8	16,5	62,0
	Razem	T	15,1	-	0,1	0,1	0,6	3,6	23,5	84,6

Tabela LXX

Umieralność z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (J44) w Polsce w latach 2000 – 2024 wg płci i wieku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from chronic obstructive pulmonary disease (J44) by sex and age groups. Poland 2000-2024. Rates per 100.000 population.

Wiek Rok Płeć			Ogółem		< 20		20-29		30-39		40-49		50-59		60-69		≥70	
			L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.	L	Wsp.
2000	Mężcz.	M	3402	18,1	2	0,0	-	-	8	0,3	37	1,2	205	10,4	971	66,3	2179	198,8
	Kobiety	K	1229	6,2	2	0,0	1	0,0	1	0,0	14	0,4	88	4,1	243	13,0	880	44,4
	Razem	T	4631	12,0	4	0,0	1	0,0	9	0,2	51	0,8	293	7,1	1214	36,4	3059	99,3
2010	Mężcz.	M	4533	24,6	-	-	2	0,1	2	0,1	39	1,6	331	119,	809	50,3	3350	246,6
	Kobiety	K	2044	10,4	-	-	-	-	2	0,1	9	0,4	139	4,6	380	19,2	1514	61,9
	Razem	T	6577	17,	-	-	2	0,0	4	0,1	45	1,0	470	8,1	1189	33,1	4864	127,8
2019	Mężcz.		3600	19,4	-	-	-	-	5	0,2	15	0,5	179	7,7	884	37,0	2517	154,7
	Kobiety		2317	6,0	-	-	-	-	2	0,0	9	0,2	92	1,9	545	10,5	1669	37,9
	Razem	T	5917	10,4	-	-	-	-	7	0,1	24	0,3	271	3,8	1429	18,8	4186	69,5
2020	Mężcz.		3738	20,1	-	-	-	-	5	0,2	29	1,0	139	6,1	866	36,2	2699	158,2
	Kobiety		2260	11,4	-	-	-	-	1	0,0	6	0,2	82	3,5	493	17,5	1678	58,6
	Razem	T	5998	15,6	-	-	-	-	6	0,1	35	0,6	221	4,8	1359	26,1	4377	95,7
2021	Mężcz.		3036	16,5	-	-	1	0,0	4	0,1	18	0,6	136	6,0	714	30,2	2163	124,1
	Kobiety		1945	9,9	-	-	-	-	1	0,0	2	0,1	48	2,1	462	16,6	1432	49,0
	Razem	T	4981	13,1	-	-	1	0,0	5	0,1	20	0,3	184	4,0	1176	22,9	3595	77,0
2022	Mężcz.		3244	17,7	-	-	1	0,0	4	0,1	21	0,7	123	5,5	802	34,9	2293	128,6
	Kobiety		2250	11,5	-	-	1	0,0	-	-	9	0,3	40	1,7	465	17,2	1735	58,4
	Razem	T	5494	14,5	-	-	2	0,0	4	0,1	30	0,5	163	3,6	1267	25,3	4028	84,8
2023	Mężcz.		3004	16,5	-	-	1	0,0	4	0,1	22	0,7	115	5,1	709	31,4	2153	115,5
	Kobiety		2223	11,4	-	-	0	-	3	0,1	6	0,2	54	2,3	431	16,3	1729	56,4
	Razem	T	5227	13,9	-	-	1	0,0	7	0,1	28	0,5	169	3,7	1140	23,2	3882	78,7
2024	Mężcz.		3144	17,3	-	-	1	0,1	3	0,1	25	0,8	120	5,2	683	30,7	2312	118,6
	Kobiety		2413	12,4	-	-	1	0,1	2	0,1	12	0,4	41	1,7	421	16,3	1936	61,0
	Razem	T	5557	14,8	-	-	2	0,1	5	0,1	37	0,6	161	3,4	1104	22,9	4248	82,9

Tabela LXXI

Umieralność z powodu astmy (J45-J46) w Polsce w latach 1970 – 2024 wg płci i wieku. Współczynniki na 100.000 ludności.

Mortality from asthma by sex and age groups. Poland 1970-2024. Rates per 100.000.

Rok	Wiek		Ogółem	< 1	1 - 9	10 - 19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	≥70
	Płeć											
1970	Mężcz.	M	19,7	1,1	0,1	0,1	0,3	0,7	2,7	19,1	94,7	303,0
	Kobiety	F	9,0	0,8	0,1	0,1	0,2	0,8	1,0	6,4	23,4	102,5
	Razem	T	14,2	0,9	0,1	0,1	0,3	0,7	2,0	12,2	54,9	174,8
1980	Mężcz.	M	13,8	-	0,04	0,2	0,3	0,6	2,8	13,3	53,1	179,8
	Kobiety	F	5,7	-	0,1	0,1	0,2	0,6	1,5	4,2	12,2	50,1
	Razem	T	9,7	-	0,1	0,2	0,3	0,6	2,1	8,4	29,8	97,8
1990	Mężcz.	M	8,4	0,4	0,1	0,2	0,2	0,4	1,3	9,7	29,9	108,2
	Kobiety	F	4,0	-	-	0,3	0,4	0,4	1,0	3,0	9,0	32,0
	Razem	T	6,1	0,2	0,05	0,3	0,3	0,4	1,1	6,2	18,0	58,9
2000	Mężcz.	M	4,2	0,5	-	0,2	0,2	0,3	1,3	4,2	12,5	42,3
	Kobiety	F	3,0	-	0,05	-	0,1	0,4	1,0	3,2	8,1	16,8
	Razem	T	3,6	0,3	0,02	0,1	0,2	0,4	1,1	3,7	10,0	25,9
2010	Mężcz.	M	1,0	-	-	-	0,1	0,1	0,2	1,1	2,7	7,7
	Kobiety	F	1,2	-	-	-	0,0	0,1	0,2	1,0	1,4	6,9
	Razem	T	1,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	1,0	2,0	7,2
2020	Mężcz.	M	1,5	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,5	2,5	10,4
	Kobiety	F	1,7	-	-	-	0,1	0,0	0,2	0,9	1,8	9,2
	Razem	T	1,6	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,7	2,1	9,7
2022	Mężcz.	M	1,3	-	-	-	0,2	0,2	0,5	0,8	2,7	7,3
	Kobiety	F	1,7	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,7	1,5	9,1
	Razem	T	1,5	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,8	2,1	8,4
2023	Mężcz.	M	1,2	-	-	-	0,0	0,0	0,3	0,5	2,2	8,3
	Kobiety	F	1,7	-	-	-	0,1	0,0	0,2	0,4	2,0	8,5
	Razem	T	1,5	-	-	-	0,0	0,0	0,2	0,5	2,1	8,4
2024	Mężcz.	M	1,0	-	-	-	-	0,3	0,2	0,4	1,3	6,9
	Kobiety	F	1,4	-	-	-	-	0,0	0,0	0,5	1,5	7,1
	Razem	T	1,2	-	-	-	-	0,2	0,1	0,5	1,4	7,0

Tabela LXXII

Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w Polsce w latach 1960-2023. Registered new cases and mortality from cancers (all sites, respiratory organs and lung). Poland 1960-2023.

LATA/YEAR S	Nowe zachorowania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Registered new cases - absolute numbers			Zgony wg Międzynarodowej Klasyfikacji Deaths - absolute numbers		
	C00 – D09 cancer total	C30-C34 resp. cancer	C33-C34 trachea and lung cancer	C00-D09 cancer total	C30-C34 resp. cancer	C33-C34 trachea and lung cancer
1960	29.421	2.725	2.055	26.402	2.826	2.600
1965	37.644	4.601	3.676	38.970	5.213	4.693
1970	56.090	8.801	6.812	44.888	7.606	6.644
1975	61.464	10.871	8.446	51.768	10.415	9.174
1980	64.959	12.958	10.567	59.698	13.377	11.958
1985	76.938	16.651	13.804	66.980	16.565	14.823
1990	83.470	19.426	16.509	72.914	19.301	17.344
1995	105.186	23.213	19.949	78.094	21.103	19.036
2000	114.871	22.260	20.018	84.559	21.753	20.002
2005	125.672	22.862	20.102	90.396	23.334	21.515
2009	138.032	23.305	20.643	93.297	24.049	22.348
2010	140.564	23.304	20.871	92.611	24.026	22.374
2011	144.336	23.254	20.837	92.198	23.830	22.251
2012	152.855	24.441	21.870	94.740	24.232	22.650
2013	156.487	24.031	21.556	94.125	24.328	22.655
2014	159.208	24.605	22.032	95.565	24.870	23.210
2015	163.281	24.797	21.997	100.601	25.516	23.745
2016	164.140	24.703	22.232	99.965	25.584	23.833
2017	164.875	24.052	21.568	99.644	25.077	23.351
2018	167.446	23.523	21.260	101.391	24.466	23.722
2019	171.218	24.501	22.299	100.324	24.780	23.136
2020	147.877	21.057	19.026	99.870	24.007	22.238
2021	171.558	22.895	20.592	93.652	22.451	20.866
2022	181.300	22.791	20.739	96.062	22.530	20.977
2023	192.922	23.271	21.068	99.676	23.779	22.168

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXIII

Zapadalność i umieralność z powodu wszystkich nowotworów złośliwych, nowotworów narządów oddechowych i płuca w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100.000 ludności. Incidence and mortality from cancer (all sites, respiratory organs and lung). Poland 1960-2023. Rate per 100.000 population.

LATA YEARS	ZAPADALNOŚĆ / NOTIFICATION RATE			UMIERALNOŚĆ / MORTALITY		
	C00 – D09 cancer total	C30-C34 resp. org. cancer	C33-C34 trachea and lung cancer	C00-D09 cancer total	C30-C34 resp. org. cancer	C33-C34 trachea and lung cancer
1960	98,4	9,1	6,8	89,3	9,5	8,7
1965	119,5	14,6	11,7	123,7	16,6	14,9
1970	172,4	27,1	20,9	138,0	23,4	20,4
1975	180,7	32,0	24,8	152,2	30,6	27,0
1980	182,6	36,4	29,7	167,8	37,6	33,6
1985	206,8	44,8	37,1	180,0	44,5	39,8
1990	219,0	51,0	43,3	191,3	50,6	45,5
1995	272,6	60,2	51,7	202,4	54,7	49,3
2000	296,7	58,5	51,0	223,7	58,1	53,2
2005	329,3	59,9	52,7	236,9	61,1	56,4
2007	338,1	59,2	52,3	243,8	62,8	58,1
2009	361,8	61,1	54,1	244,5	63,0	58,6
2010	364,9	60,5	54,2	240,4	62,4	58,1
2011	374,6	60,4	54,1	239,3	61,9	57,8
2012	396,7	63,4	56,8	245,9	62,9	58,8
2013	406,4	62,4	56,0	244,5	63,2	58,8
2014	413,7	63,9	57,2	248,3	64,6	60,3
2015	424,6	64,5	57,2	261,6	66,4	61,7
2016	427,1	64,3	57,9	260,1	66,6	62,0
2017	429,1	62,6	56,1	259,3	65,3	60,8
2018	435,9	61,2	55,3	263,9	66,3	61,8
2019	446,0	63,8	58,1	261,4	64,6	60,3
2020	385,6	54,9	49,6	260,4	62,6	58,0
2021	449,5	60,0	49,6	245,4	58,8	54,7
2022	479,3	60,3	54,8	253,9	59,6	55,5
2023	511,8	61,7	55,9	264,4	63,1	58,8

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXIV

Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych układu oddechowego wg płci w Polsce w latach 1960-2023.

Registered new cases and mortality from respiratory organs and lung cancer by sex. Poland 1960-2023.

Lata/years	Nowe zachorowania /New cases – absolute numbers				Zgony /Deaths – absolute numbers			
	C30-C34		C33-C34		C30-C34		C33-C34	
	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)
1960	2.290	435	1.700	355	2.267	559	2.080	520
1965	3.825	776	3.047	629	4.316	897	3.880	813
1970	7.527	1.274	5.805	1.007	6.396	1.210	5.625	1.019
1975	9.334	1.537	7.228	1.218	8.809	1.606	7.807	1.367
1980	11.169	1.789	9.063	1.504	11.357	2.020	10.146	1.812
1985	14.282	2.369	11.773	2.031	14.147	2.418	12.618	2.205
1990	16.410	3.016	13.832	2.677	16.260	3.041	14.539	2.805
1992	17.664	3.457	14.867	3.024	16.431	3.103	14.688	2.852
1993	19.194	3.957	16.242	3.496	16.907	3.363	15.193	3.102
1995	19.000	4.213	16.211	3.738	17.467	3.636	15.686	3.350
2004	18.026	4.971	15.741	4.618	18.138	4.842	16.565	4.641
2005	17.644	5.218	15.289	4.813	18.165	5.169	16.562	4.953
2007	16.935	5.618	14.683	5.263	18.172	5.761	16.583	5.566
2009	17.002	6.303	14.731	5.912	17.884	6.165	16.392	5.956
2010	16.888	6.416	14.819	6.052	17.637	6.389	16.204	6.170
2011	16.610	6.644	14.544	6.293	17.377	6.453	15.988	6.263
2012	17.372	7.069	15.197	6.673	17.567	6.665	16.206	6.444
2013	16.682	7.349	14.631	6.925	17.427	6.901	16.002	6.653
2014	16.849	7.756	14.699	7.333	17.280	7.590	15.847	7.363
2015	16.797	8.000	14.479	7.518	17.755	7.761	16.261	7.484
2016	16.558	8.145	14.487	7.745	17.704	7.880	16.190	7.643
2017	15.899	8.153	13.812	7.756	16.993	8.084	15.514	7.837
2018	15.305	8.218	13.445	7.815	17.116	8.350	15.631	8.091
2019	15.657	8.844	13.819	8.480	16.299	8.481	14.921	8.215
2020	13.308	7.749	11.635	7.391	15.745	8.262	14.229	8.009
2021	14.245	8.650	12.344	8.248	14.384	8.067	13.059	7.807
2022	13.962	8.829	12.286	8.453	14.356	8.174	13.042	7.935
2023	14.062	9.209	12.274	8.794	14.912	8.867	13.560	8.608

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXV

Zapadalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych układu oddechowego wg płci w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100.000 ludności.

Incidence and mortality from respiratory organs and lung cancer by sex. Poland 1960-2023. Rates per 100.000 population.

Lata Years	Zapadalność (<i>Incidence</i>)				Umieralność (<i>Mortality</i>)			
	C30-C34		C33-C34		C30-C34		C33-C34	
	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)	M (M)	K (F)
1960	15,9	2,8	11,8	2,3	15,7	3,6	14,4	3,4
1965	25,0	4,8	19,9	3,9	28,1	5,6	25,3	5,0
1970	47,7	7,6	36,8	6,0	40,5	7,2	35,6	6,1
1975	56,4	8,8	43,7	7,0	53,2	9,1	47,2	7,8
1980	64,5	9,8	52,3	8,2	65,5	11,1	58,5	9,9
1985	78,8	12,5	64,9	10,7	77,9	12,7	69,5	11,6
1990	88,4	15,4	74,5	13,7	87,6	15,6	78,3	14,4
1992	94,6	17,6	79,6	15,4	87,9	15,7	78,6	14,5
1993	102,5	20,1	86,7	17,7	90,2	17,0	81,1	15,7
1995	101,2	21,3	86,3	18,9	93,0	18,4	83,5	16,9
2005	95,6	26,5	82,8	24,4	98,4	26,2	89,7	25,1
2007	92,0	28,5	79,7	26,7	98,7	29,2	90,0	28,3
2008	88,9	29,1	76,9	27,1	99,8	29,8	91,7	28,6
2009	92,3	31,9	80,0	30,0	97,1	31,2	89,0	30,2
2010	90,6	32,3	79,5	30,5	94,6	32,2	86,9	31,1
2011	89,1	33,4	78,0	31,7	93,2	32,5	85,7	31,5
2012	93,1	35,6	81,5	33,6	94,2	33,5	86,9	32,4
2013	89,5	37,0	78,5	34,9	93,5	34,7	85,9	33,5
2014	90,5	39,1	78,9	36,9	92,8	38,2	85,1	37,1
2015	90,3	40,3	77,8	37,9	95,4	39,1	87,4	37,7
2016	89,1	41,1	77,9	39,0	95,2	39,7	87,1	38,5
2017	85,5	41,1	74,3	39,1	91,4	40,8	83,5	39,5
2018	82,4	41,4	72,3	39,4	92,1	42,1	84,1	40,8
2019	84,3	44,6	74,4	42,8	87,8	42,8	80,4	41,5
2020	71,7	39,1	62,7	37,3	84,9	41,7	76,7	40,4
2021	77,2	43,9	66,9	41,8	78,0	40,9	70,8	39,6
2022	76,4	45,2	67,2	43,2	78,5	41,8	71,3	40,6
2023	77,2	47,3	67,4	45,1	81,9	45,5	74,4	44,2

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXVI

Zapadalność na nowotwory złośliwe płuca (C34) wg płci i wieku w Polsce w latach 1960-2023. Współczynniki na 100.000 ludności.

Lung cancer notification rates by age groups and sex. Poland 1960-2023. Rates per 100.00 population.

Rok/ wiek /płec	Ogółem		< 20		20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 59		60 - 69		70 - 79		> 80	
	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F	Mężcz. M	Kob. F
1960	11,8	2,3	0,3	0,1	2,9	0,4	2,3	0,7	11,7	2,2	44,1	6,3	74,7	12,4	57,6	8,3	36,9	6,0
1970	36,8	6,0	0,0	0,1	0,4	0,1	4,3	1,3	28,9	4,3	95,6	11,1	228,6	24,3	242,5	35,4	177,1	36,2
1980	52,3	8,2	0,1	0,1	0,6	0,2	5,3	1,3	42,8	4,8	148,2	17,5	256,0	30,7	346,2	40,0	223,1	36,5
1990	74,5	13,7	0,1	0,1	0,5	0,2	5,5	1,9	42,5	9,0	204,3	23,5	392,5	48,9	420,4	69,9	335,6	61,3
2000	81,5	20,8	0,0	0,2	0,4	0,5	3,6	1,6	36,7	14,2	155,3	41,4	390,7	64,6	513,1	77,3	360,7	75,6
2002	81,9	22,2	0,0	0,1	0,5	0,3	2,6	1,3	35,0	13,8	150,1	46,8	378,3	66,1	492,3	77,7	373,2	72,7
2006	82,4	25,8	0,1	0,0	0,3	0,1	2,4	1,5	28,8	13,8	142,5	51,5	351,3	77,1	485,3	82,2	371,4	78,6
2008	76,9	27,1	0,0	0,0	0,2	0,3	2,0	1,1	23,1	11,2	128,3	53,2	307,6	88,6	441,8	79,2	345,2	69,8
2009	80,0	30,0	-	0,0	0,3	0,1	1,4	1,5	23,1	11,8	132,7	55,9	311,4	95,4	452,8	91,5	345,3	79,8
2010	79,5	30,5	0,0	0,0	0,4	0,1	1,6	1,2	19,8	9,6	124,8	55,5	310,3	104,0	447,3	91,6	338,8	69,0
2011	77,9	31,6	0,0	0,0	0,5	0,3	1,4	1,0	17,3	10,2	113,8	54,9	298,0	108,5	448,9	93,7	331,9	70,0
2012	81,4	33,5	0,0	0,0	0,3	0,3	1,7	1,4	16,0	8,9	116,8	52,7	314,3	114,4	438,7	103,0	355,7	78,2
2013	78,4	34,8	0,0	-	0,4	0,3	1,3	1,1	13,4	7,9	106,0	52,6	299,3	123,8	425,1	107,4	339,8	68,6
2014	78,8	36,9	0,0	-	0,2	0,3	1,2	1,0	14,1	7,5	102,9	51,1	289,1	128,2	428,7	115,7	344,6	79,1
2015	77,7	37,8	0,0	-	0,4	0,3	1,3	1,3	11,5	7,5	96,5	50,0	285,2	131,1	414,5	118,7	331,6	75,2
2016	77,8	39,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,4	1,0	10,5	7,1	90,0	49,0	287,2	130,9	413,5	134,9	300,9	68,5
2017	74,2	39,1	0,1	0,03	0,4	0,3	1,2	1,1	8,2	6,0	79,2	43,8	264,5	130,8	395,2	135,7	310,1	72,7
2018	72,2	39,3	0,1	0,03	0,3	0,3	0,9	1,0	8,2	5,7	75,9	39,5	249,8	126,0	383,6	148,0	284,2	72,8
2019	74,4	42,7	0,3	0,03	0,4	0,5	1,0	1,1	8,7	5,8	71,2	40,1	252,5	132,7	396,7	165,1	277,3	77,2
2020	62,6	37,3	0,1	0,05	0,2	0,1	0,9	0,7	6,9	4,7	60,5	34,6	205,6	112,8	333,0	147,7	220,9	62,0
2021	66,9	41,8	0,03	0,05	0,5	0,3	1,2	0,9	6,9	5,0	58,7	31,6	218,2	122,8	351,0	172,8	251,0	73,7
2022	67,2	43,2	0,03	-	0,4	0,5	1,4	1,5	6,1	4,8	51,8	30,7	213,9	121,6	361,1	181,2	265,4	80,0
2023	67,3	45,1	0,08	0,01	0,2	0,6	1,5	0,9	6,9	4,7	48,0	29,7	205,3	120,2	359,4	195,6	271,7	81,0

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii

Tabela LXXVII

Umieralność z powodu nowotworów złośliwych płuca (C34) wg płci i wieku w Polsce w latach 1960-2023.

Współczynniki na 100.000 ludności. Lung cancer mortality rates by age groups and sex. Poland 1960-2023. Rates per 100.00 population.

Wiek płeć Rok	Ogółem		< 20		20 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 59		60 - 69		70 - 79		> 80	
	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.	Męż. M	Kob. F.
1960	14,4	3,4	0,2	0,1	0,6	0,4	1,7	1,2	11,7	3,6	48,5	7,2	104,1	16,8	106,4	19,1	50,1	14,1
1970	35,6	6,1	0,2	0,2	0,3	0,1	3,8	0,9	24,0	4,2	89,8	10,9	223,0	25,0	258,6	37,5	159,5	35,1
1980	58,5	9,9	0,0	0,0	0,6	0,4	4,4	0,7	44,2	5,4	154,6	20,1	306,3	37,5	410,0	51,6	228,9	44,6
1990	78,3	14,4	0,0	0,1	0,3	0,5	4,8	1,7	39,5	8,4	208,6	24,2	415,6	52,1	478,6	73,9	355,7	60,9
2000	85,1	20,2	0,0	0,0	0,3	0,2	2,5	1,3	33,7	12,8	146,0	36,2	411,3	61,2	577,4	81,8	416,8	87,3
2005	89,7	25,1	-	0,0	0,2	0,0	1,7	1,0	29,3	12,9	139,9	44,7	388,7	71,6	573,5	90,7	498,3	99,0
2006	90,4	26,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	1,1	26,7	11,2	139,3	43,7	383,5	78,7	572,6	90,8	487,4	102,5
2008	91,7	28,6	-	-	0,1	0,1	1,0	0,7	25,1	10,2	136,4	47,2	347,7	88,3	575,7	98,7	515,7	98,6
2009	89,0	30,2	-	0,0	0,1	0,1	1,0	0,7	21,4	10,8	129,3	48,8	327,2	91,1	559,2	101,4	493,0	103,9
2010	86,9	31,1	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	0,7	17,9	9,1	121,2	49,4	314,4	95,5	536,4	104,1	499,5	103,1
2011	85,6	31,5	0,0	0,0	0,1	0,0	1,0	0,6	18,3	7,2	115,8	50,8	304,0	94,3	514,8	108,1	489,3	97,2
2012	86,8	32,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,8	0,8	15,4	7,5	117,1	45,2	302,9	103,7	515,7	107,6	477,2	100,8
2013	85,8	33,5	-	-	0,1	0,1	0,6	0,7	12,9	6,6	108,2	47,8	304,9	106,0	493,9	110,7	475,2	96,7
2014	85,0	37,0	-	-	0,1	0,1	1,4	0,6	12,5	6,1	98,9	46,9	289,1	119,0	496,0	125,0	487,7	106,5
2015	87,3	37,7	0,0	-	0,1	0,1	0,9	0,6	10,7	5,3	98,9	45,8	296,8	119,3	493,8	128,3	493,9	106,9
2016	87,0	38,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,9	0,7	9,4	5,7	92,8	42,0	295,5	115,9	481,7	138,5	476,9	113,0
2017	83,4	39,5	-	-	0,04	-	1,0	0,5	8,1	5,2	85,7	41,9	273,9	118,6	451,9	140,9	466,1	111,7
2018	84,0	40,7	-	-	0,2	0,0	0,9	0,7	7,3	3,8	70,7	33,6	263,9	120,6	470,6	155,5	502,3	118,5
2019	80,2	41,4	-	-	0,0	0,1	1,0	0,7	6,8	4,7	72,8	35,1	256,3	117,6	423,9	158,9	418,4	115,1
2020	76,6	40,4	-	-	0,04	0,05	0,6	0,5	6,6	3,8	66,3	31,1	239,0	112,9	395,7	158,4	399,7	109,8
2021	70,7	39,5	-	0,05	0,14	0,05	0,6	0,4	5,7	3,7	58,7	25,4	214,2	107,4	372,5	162,7	369,4	105,7
2022	71,3	40,5	-	0,05	0,05	-	0,9	0,5	5,8	3,2	49,3	25,3	216,3	106,6	374,5	166,5	389,8	112,8
2023	74,4	44,1	-	-	0,1	0,1	0,7	0,6	5,1	3,1	50,0	22,5	214,8	108,0	393,2	189,0	405,3	126,1

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii

Tabela LXXVIII

Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe (C33-C34) - kobiety 2023 rok. Współczynniki na 100.000 ludności.

Województwa	Zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2023				Zgony na nowotwory złośliwe w roku 2023			
	C00-D09	Wsp.	C33-C34	Wsp.	C00-D09	Wsp.	C33-C34	Wsp.
POLSKA	95997	492,7	8794	45,1	46354	237,9	8608	44,2
1. Dolnośląskie	7581	506,2	818	54,6	3742	249,9	768	51,3
2. Kujawsko-pomorskie	5742	555,6	684	66,2	2692	260,5	557	53,9
3. Lubelskie	5199	499,4	484	46,5	2319	222,8	415	39,9
4. Lubuskie	2101	417,6	199	39,6	1216	241,7	264	52,5
5. Łódzkie	6356	512,2	669	53,9	3199	257,8	631	50,9
6. Małopolskie	7682	435,0	425	24,1	3957	224,1	565	32,0
7. Mazowieckie	14156	493,0	1272	44,3	6761	235,5	1272	44,3
8. Opolskie	2473	509,4	178	36,7	1174	241,8	207	42,6
9. Podkarpackie	4688	442,3	288	27,2	1770	167,0	262	24,7
10. Podlaskie	3125	533,3	199	34,0	1279	218,3	171	29,2
11. Pomorskie	5841	481,6	619	51,0	2829	233,2	591	48,7
12. Śląskie	10894	484,4	982	43,7	6208	276,0	1052	46,8
13. Świętokrzyskie	3322	551,2	317	52,6	1452	240,9	250	41,5
14. Warmińsko-mazurskie	3584	513,9	468	67,1	1434	205,6	335	48,0
15. Wielkopolskie	9045	504,0	733	40,8	4144	230,9	757	42,2
16. Zachodniopomorskie	4208	499,5	459	54,5	2178	258,5	511	60,7

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXIX

Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe (C33-C34) - mężczyźni 2023 rok. Współczynniki na 100.000 ludności.

Województwa	Zachorowania na nowotwory złośliwe w roku 2023				Zgony na nowotwory złośliwe w roku 2023			
	C00-D09	Wsp.	C33-C34	Wsp.	C00-D09	Wsp.	C33-C34	Wsp.
POLSKA	96925	532,1	12274	67,4	53322	292,7	13560	74,4
1.Dolnośląskie	7101	512,5	929	67,1	4253	307,0	1089	78,6
2.Kujawsko-pomorskie	5784	597,4	930	96,1	3061	316,1	801	82,7
3.Lubelskie	6273	642,2	767	78,5	2831	289,8	714	73,1
4.Lubuskie	2390	503,8	271	57,1	1316	277,4	345	72,7
5.Łódzkie	6049	535,5	923	81,7	3557	314,9	941	83,3
6.Małopolskie	8135	489,3	788	47,4	4595	276,4	1076	64,7
7.Mazowieckie	13010	493,2	1639	62,1	7173	271,9	1895	71,8
8.Opolskie	2490	548,5	270	59,5	1348	296,9	325	71,6
9.Podkarpackie	5080	500,0	555	54,6	2421	238,3	566	55,7
10.Podlaskie	3135	565,1	312	56,2	1515	273,1	360	64,9
11.Pomorskie	6434	561,7	792	69,1	3240	282,9	831	72,5
12.Śląskie	10599	508,6	1387	66,6	6911	331,6	1579	75,8
13.Świętokrzyskie	3842	673,3	532	93,2	1845	323,3	500	87,6
14.Warmińsko-mazurskie	3778	568,1	624	93,8	1828	274,9	521	78,3
15.Wielkopolskie	8989	530,1	1065	62,8	4851	286,1	1279	75,4
16.Zachodniopomorskie	3836	483,2	490	61,7	2577	324,6	738	93,0

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów - Nowotwory złośliwe w Polsce. Narodowy Instytut Onkologii.

Tabela LXXX


Ludność Polski wg województw, płci i wieku – stan na 30 VI 2025 rok. Population by sex, age groups and voivodeships. Poland 30 VI 2025 r.

Województwa/voivodships	Ogółem total	Mężcz. male	Kobiety female	Miasto urban	Wieś rural	Grupy wieku/ age groups				
						0-14	15-19	20-44	45-64	65+
POLSKA	37 402 052	18 063 426	19 338 626	22 213 305	15 188 747	5 397 400	2 022 839	12 189 757	10 001 414	7 790 642
1. Dolnośląskie	2 862 442	1 374 984	1 487 458	1 917 592	944 850	390 905	144 937	950 597	753 315	622 688
2. Kujawsko-pomorskie	1 977 537	956 074	1 021 463	1 143 848	833 689	277 732	110 503	633 940	538 055	417 307
3. Lubelskie	1 987 787	961 957	1 025 830	923 744	1 064 043	275 771	109 550	630 367	536 896	435 203
4. Lubuskie	966 389	468 682	497 707	617 723	348 666	134 790	54 524	307 847	263 278	205 950
5. Łódzkie	2 336 680	1 113 412	1 223 268	1 445 047	891 633	316 341	121 420	720 975	637 141	540 803
6. Małopolskie	3 427 656	1 661 919	1 765 737	1 638 045	1 789 611	529 007	185 980	1 175 116	886 501	651 052
7. Mazowieckie	5 506 411	2 636 822	2 869 589	3 566 150	1 940 261	852 404	301 192	1 844 643	1 424 203	1 083 969
8. Opolskie	926 842	447 728	479 114	488 189	438 653	121 530	45 454	290 613	266 863	202 382
9. Podkarpackie	2 057 923	1 006 811	1 051 112	844 084	1 213 839	301 379	113 776	677 681	55 5713	409 374
10. Podlaskie	1 129 475	549 198	580 277	685 774	443 701	162 276	60 130	363 390	307 707	235 972
11. Pomorskie	2 358 779	1 144 840	1 213 939	1 467 532	891 247	367 612	134 049	800 103	603 845	453 170
12. Śląskie	4 275 429	2 054 637	2 220 792	3 233 169	1 042 260	581 974	221 357	1 333 972	1 189 588	948 538
13. Świętokrzyskie	1 152 544	560 129	592 415	520 104	632 440	149 086	60 644	354 280	317 521	271 013
14. Warmińsko-mazurskie	1 343 915	65 5421	68 8494	78 8663	55 5252	187 003	76 554	432 215	370 199	277 944
15. Wielkopolskie	3 474 825	1 687 336	1 787 489	1 835 885	1 638 940	534 624	196 919	1 160 366	908 608	674 308
16. Zachodniopomorskie	1 617 418	783 476	833 942	1 097 756	519 662	214 966	85 850	513 652	441 981	360 969

08

PROFILE WOJEWÓDZKIE


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w Polsce w 2025 r.



Powierzchnia w km2 313 933
 Ludność 30 VI 2025 37 402 052
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 90 759

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	93,2%
z kontaktów	2,6%
w badaniach profilaktycznych	2,8%
w innych badaniach	1,4%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	3829
współczynnik zapadalności	10,2
w tym:	
nowe zachorowania - liczba	3374
współczynnik	9,0
wznowy - liczba	455
współczynnik	1,2
gruźlica płuc - liczba	3681
współczynnik	9,8
gruźlica pozapłucna - liczba	148
współczynnik	0,4
% ogółu zachorowań	3,9%

zachorowania wśród dzieci


liczba	64
współczynnik	1,2

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	3180
współczynnik	8,5
% ogółu zachorowań	83,1%
w tym:	
gruźlica płuc - liczba	3085
współczynnik	8,2
% ogółu gruźlicy płuc	83,8%
gruźlica pozapłucna - liczba	95
współczynnik	0,3
% gruźlicy pozapłucnej	64,2%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 259
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 185


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	448
współczynnik	1,2

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. dolnośląskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 19.947
 Ludność 30 VI 2025 2 862 442
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 96 997

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 315
 współczynnik zapadalności 11,0
 miejsce w rankingu 11
 w tym:

nowe zachorowania - liczba 263
 współczynnik 9,2
 wznowy - liczba 52
 współczynnik 1,8
 gruźlica płuc - liczba 295
 współczynnik 10,3
 gruźlica pozapłucna - liczba 20
 współczynnik 0,7
 % ogółu zachorowań 6,3%

zachorowania wśród dzieci

liczba 1
 współczynnik 0,3

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 275
 współczynnik 9,6
 % ogółu zachorowań 87,3%

w tym:



gruźlica płuc - liczba 262
 współczynnik 9,2
 % ogółu gruźlicy płuc 88,8%
 miejsce w rankingu 5
 gruźlica pozapłucna - liczba 13
 współczynnik 0,5
 % gruźlicy pozapłucnej 65,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 34

Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 17

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów 85,1%
 z kontaktów 2,0%
 w badaniach profilaktycznych 7,8%
 w innych badaniach 5,1%



Umieralność - 2024

liczba 26
 współczynnik 0,9


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. kujawsko-pomorskim w 2025r.



Powierzchnia w km2 17.971
 Ludność 30 VI 2025 1 977 537
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 72 843

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	89,9%
z kontaktów	8,1%
w badaniach profilaktycznych	1,5%
w innych badaniach	0,5%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	206
współczynnik zapadalności	10,4
miejsce w rankingu	7

w tym:

nowe zachorowania - liczba	183
współczynnik	9,3
wznovy - liczba	23
współczynnik	1,2
gruźlica płuc - liczba	198
współczynnik	10,0
gruźlica pozapłucna - liczba	8
współczynnik	0,4
% ogółu zachorowań	3,9%

zachorowania wśród dzieci

liczba	4
współczynnik	1,4

Zapadalność potw. bakteriologicznie


ogółem liczba	185
współczynnik	9,4
% ogółu zachorowań	89,8%

w tym:

gruźlica płuc - liczba	179
współczynnik	9,1
% ogółu gruźlicy płuc	90,4%
miejsce w rankingu	4
gruźlica pozapłucna - liczba	6
współczynnik	0,3
% gruźlicy pozapłucnej	75,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	2
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	—


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	26
współczynnik	1,3


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. lubelskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 25 122
 Ludność 30 VI 2025 1 987 787
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 62 534

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	97,0%
z kontaktów	1,1%
w badaniach profilaktycznych	1,5%
w innych badaniach	0,4%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem


liczba zachorowań	270
współczynnik zapadalności	13,6
miejsce w rankingu	14
w tym:	
nowe zachorowania - liczba	224
współczynnik	11,3
wznowy - liczba	46
współczynnik	2,3
gruźlica płuc - liczba	263
współczynnik	13,2
gruźlica pozapłucna - liczba	7
współczynnik	0,4
% ogółu zachorowań	2,6%

zachorowania wśród dzieci

liczba	3
współczynnik	1,1

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	189
współczynnik	9,5
% ogółu zachorowań	70,0%
w tym:	
gruźlica płuc - liczba	185
współczynnik	9,3
% ogółu gruźlicy płuc	70,3%
miejsce w rankingu	15
gruźlica pozapłucna - liczba	4
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	57,1%




Umieralność - 2024

liczba	28
współczynnik	1,4

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	2
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	2

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. lubuskim w 2025 r.




Powierzchnia w km² 13.988
 Ludność 30 VI 2025 966 389
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 72 438

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	86,6%
z kontaktów	10,2%
w badaniach profilaktycznych	0,8%
w innych badaniach	2,4%

zapadalność



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	134
współczynnik zapadalności	13,9
miejsce w rankingu	15
w tym:	
nowe zachorowania - liczba	121
współczynnik	12,5
wznowy - liczba	13
współczynnik	1,3
gruźlica płuc - liczba	127
współczynnik	13,1
gruźlica pozapłucna - liczba	7
współczynnik	0,7
% ogółu zachorowań	5,2%


zachorowania wśród dzieci

liczba	8
współczynnik	5,9

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	99
współczynnik	10,2
% ogółu zachorowań	73,9%
w tym:	
gruźlica płuc - liczba	97
współczynnik	10,0
% ogółu gruźlicy płuc	76,4%
miejsce w rankingu	13
gruźlica pozapłucna - liczba	2
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	28,6%

Struktura bakteriologiczna




Umieralność - 2024

liczba	10
współczynnik	1,0

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy -
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością -


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. łódzkim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 18.219
 Ludność 30 VI 205 2 336 680
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 86 151

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	95,2%
z kontaktów	0,4%
w badaniach profilaktycznych	2,8%
w innych badaniach	1,6%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	259
współczynnik zapadalności	11,1
miejsce w rankingu	12
w tym:	

nowe zachorowania - liczba	234
współczynnik	10,0
wznowy - liczba	25
współczynnik	1,1
gruźlica płuc - liczba	252
współczynnik	10,8
gruźlica pozapłucna - liczba	7
współczynnik	0,3
% ogółu zachorowań	2,7%

zachorowania wśród dzieci


liczba	3
współczynnik	0,9

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	180
współczynnik	7,7
% ogółu zachorowań	69,5%
w tym:	
gruźlica płuc - liczba	175
współczynnik	7,5
% ogółu gruźlicy płuc	69,4%
miejsce w rankingu	16
gruźlica pozapłucna - liczba	5
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	71,4%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	18
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	3


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	23
współczynnik	1


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. małopolskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 15.184
 Ludność 30 VI 2025 3 427 656
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 80 976

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	91,7%
z kontaktów	5,4%
w badaniach profilaktycznych	2,0%
w innych badaniach	0,9%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	364
współczynnik zapadalności	10,6
miejsce w rankingu	9

w tym:

nowe zachorowania - liczba	323
współczynnik	9,4
wznowy - liczba	41
współczynnik	1,2
gruźlica płuc - liczba	350
współczynnik	10,2
gruźlica pozapłucna - liczba	14
współczynnik	0,4
% ogółu zachorowań	3,8%

zachorowania wśród dzieci

liczba	12
współczynnik	2,3

Zapadalność potw. bakteriologicznie


ogółem liczba	312
współczynnik	9,1
% ogółu zachorowań	85,7%

w tym:

gruźlica płuc - liczba	305
współczynnik	8,9
% ogółu gruźlicy płuc	87,1%
miejsce w rankingu	6
gruźlica pozapłucna - liczba	7
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	50,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	22
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	7


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	20
współczynnik	0,6


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. mazowieckim w 2025 r.



Powierzchnia w km ²	35.559
Ludność 30 VI 2025	5 506 411
Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r.	82 415

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	88,7%
z kontaktów	2,9%
w badaniach profilaktycznych	6,7%
w innych badaniach	1,7%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	491
współczynnik zapadalności	8,9
miejsce w rankingu	5

w tym:

nowe zachorowania - liczba	431
współczynnik	7,8
wznowy - liczba	60
współczynnik	1,1
gruźlica płuc - liczba	477
współczynnik	8,7
gruźlica pozapłucna - liczba	14
współczynnik	0,3
% ogółu zachorowań	2,9%

zachorowania wśród dzieci

liczba	7
współczynnik	0,8

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	454
---------------	-----

współczynnik	8,2
% ogółu zachorowań	92,5%


w tym:

gruźlica płuc - liczba	444
współczynnik	8,1
% ogółu gruźlicy płuc	93,1%
miejsce w rankingu	2
gruźlica pozapłucna - liczba	10
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	71,4%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	28
---	----

Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	24
---	----


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	68
współczynnik	1,2


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. opolskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 9.412
 Ludność 30 VI 2025 926 842
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 72 963

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	77,3%
z kontaktów	9,3%
w badaniach profilaktycznych	5,4%
w innych badaniach	8,0%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	78
współczynnik zapadalności	8,4
miejsce w rankingu	4

w tym:

nowe zachorowania - liczba	65
współczynnik	7,0
wznowy - liczba	13
współczynnik	1,4
gruźlica płuc - liczba	75
współczynnik	8,1
gruźlica pozapłucna - liczba	3
współczynnik	0,3
% ogółu zachorowań	3,8%

zachorowania wśród dzieci

liczba	1
współczynnik	0,8

Zapadalność potw. bakteriologicznie


ogółem liczba	54
współczynnik	5,8
% ogółu zachorowań	69,2%

w tym:

gruźlica płuc - liczba	53
współczynnik	5,7
% ogółu gruźlicy płuc	70,7%
miejsce w rankingu	14
gruźlica pozapłucna - liczba	1
współczynnik	0,1
% gruźlicy pozapłucnej	33,3%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	-
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	-


Struktura bakteriologiczna



Umieralność - 2024

liczba	8
współczynnik	0,9

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. podkarpackim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 17.845
 Ludność 30 VI 2025 2 057 923
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 64 987

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 186
 współczynnik zapadalności 9,0
 miejsce w rankingu 6
 w tym:
 nowe zachorowania - liczba 169
 współczynnik 8,2
 wznowy - liczba 17
 współczynnik 0,8
 gruźlica płuc - liczba 180
 współczynnik 8,7
 gruźlica pozapłucna - liczba 6
 współczynnik 0,3
 % ogółu zachorowań 3,2%

zachorowania wśród dzieci

liczba 1
 współczynnik 0,3

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 147
 współczynnik 7,1
 % ogółu zachorowań 79,0%


w tym:

gruźlica płuc - liczba 144
 współczynnik 7,0
 % ogółu gruźlicy płuc 80,0%
 miejsce w rankingu 11
 gruźlica pozapłucna - liczba 3
 współczynnik 0,1
 % gruźlicy pozapłucnej 50,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 9
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 5

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów 99,4%
 z kontaktów 0,6%
 w badaniach profilaktycznych -
 w innych badaniach -



Umieralność - 2024

liczba 17
 współczynnik 0,8

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. podlaskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 20.187
 Ludność 30 VI 2025 1 129 475
 Produkt krajowy brutto PKB na 1
 mieszkańca - 2023 r. 70 079

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 85
 współczynnik zapadalności 7,5
 miejsce w rankingu 3
 w tym:
 nowe zachorowania - liczba 66
 współczynnik 5,8
 wznowy - liczba 19
 współczynnik 1,7
 gruźlica płuc - liczba 83
 współczynnik 7,3
 gruźlica pozapłucna - liczba 2
 współczynnik 0,2
 % ogółu zachorowań 2,4%

zachorowania wśród dzieci

liczba -
 współczynnik -



Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 73
 współczynnik
 % ogółu zachorowań 6,5%
 w tym: 85,9%
 gruźlica płuc - liczba 71
 współczynnik 6,3
 % ogółu gruźlicy płuc 85,5%
 miejsce w rankingu 9
 gruźlica pozapłucna - liczba 2
 współczynnik 0,2
 % gruźlicy pozapłucnej 100,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co
 najmniej 1 lek p/prątkowy 2
 Liczba chorych z wielolekową
 lekoopornością -

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów 96,4%
 z kontaktów -
 w badaniach profilaktycznych 2,4%
 w innych badaniach 1,2%



Umieralność - 2024

liczba 11
 współczynnik 1

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. pomorskim w 2025 r.



Powierzchnia w km2	19 547
Ludność 30 VI 2025	2 358 779
Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r.	86 643

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	250
współczynnik zapadalności	10,6
miejsce w rankingu	8

w tym:

nowe zachorowania - liczba	229
współczynnik	9,7
wznowy - liczba	21
współczynnik	0,9
gruźlica płuc - liczba	234
współczynnik	9,9
gruźlica pozapłucna - liczba	16
współczynnik	0,7
% ogółu zachorowań	6,4%

zachorowania wśród dzieci

liczba	13
współczynnik	3,5

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	225
współczynnik	9,5
% ogółu zachorowań	90,0%



w tym:

gruźlica płuc - liczba	215
współczynnik	9,1
% ogółu gruźlicy płuc	91,9%
miejsce w rankingu	3
gruźlica pozapłucna - liczba	10
współczynnik	0,4
% gruźlicy pozapłucnej	62,5%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy	77
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością	77

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów	95,7%
z kontaktów	3,9%
w badaniach profilaktycznych	-
w innych badaniach	0,4%



Umieralność - 2024

liczba	33
współczynnik	1,4

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. śląskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 12.334
 Ludność 30 VI 2025 4 275 429
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 93 591

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 618
 współczynnik zapadalności 14,5
 miejsce w rankingu 16

w tym:

nowe zachorowania - liczba 551
 współczynnik 12,9
 wznowy - liczba 67
 współczynnik 1,6
 gruźlica płuc - liczba 605
 współczynnik 14,2
 gruźlica pozapłucna - liczba 13
 współczynnik 0,3
 % ogółu zachorowań 2,1%

zachorowania wśród dzieci

liczba 2
 współczynnik 0,3

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 482
 współczynnik 11,3
 % ogółu zachorowań 78,0%



w tym:

gruźlica płuc - liczba 474
 współczynnik 11,1
 % ogółu gruźlicy płuc 78,3%
 miejsce w rankingu 12
 gruźlica pozapłucna - liczba 8
 współczynnik 0,2
 % gruźlicy pozapłucnej 61,5%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 10
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 6

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów 95,9%
 z kontaktów 0,2%
 w badaniach profilaktycznych 3,1%
 w innych badaniach 0,8%



Umieralność - 2024

liczba 98
 współczynnik 2,3


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. świętokrzyskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 11.709
 Ludność 30 VI 2025 1 152 544
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 67 847

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	98,3%
z kontaktów	0,8%
w badaniach profilaktycznych	-
w innych badaniach	0,9%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem


liczba zachorowań	130
współczynnik zapadalności	11,3
miejsce w rankingu	13
w tym:	
nowe zachorowania - liczba	114
współczynnik	9,9
wznowy - liczba	16
współczynnik	1,4
gruźlica płuc - liczba	120
współczynnik	10,4
gruźlica pozapłucna - liczba	10
współczynnik	0,9
% ogółu zachorowań	7,7%

zachorowania wśród dzieci

liczba	4
współczynnik	2,7

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	112
współczynnik	9,7
% ogółu zachorowań	86,2%
w tym:	
gruźlica płuc - liczba	103
współczynnik	8,9
% ogółu gruźlicy płuc	85,8%
miejsce w rankingu	8
gruźlica pozapłucna - liczba	9
współczynnik	0,8
% gruźlicy pozapłucnej	90,0%




Umieralność - 2024

liczba	11
współczynnik	0,9

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 2
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 1

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. warmińsko-mazurskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 24.174
 Ludność 30 VI 2025 1 343 915
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023r. 64 077

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 90
 współczynnik zapadalności 6,7
 miejsce w rankingu 2
 w tym:
 nowe zachorowania - liczba 87
 współczynnik 6,5
 wznowy - liczba 3
 współczynnik 0,2
 gruźlica płuc - liczba 82
 współczynnik 6,1
 gruźlica pozapłucna - liczba 8
 współczynnik 0,6
 % ogółu zachorowań 8,9%

zachorowania wśród dzieci

liczba 2
 współczynnik 1,1



Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 75
 współczynnik 5,6
 % ogółu zachorowań 83,3%
 w tym:
 gruźlica płuc - liczba 70
 współczynnik 5,2
 % ogółu gruźlicy płuc 85,4%
 miejsce w rankingu 10
 gruźlica pozapłucna - liczba 5
 współczynnik 0,4
 % gruźlicy pozapłucnej 62,5%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 18
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 18

Wykrywanie gruźlicy płuc


z objawów 96,3%
 z kontaktów 3,7%
 w badaniach profilaktycznych -
 w innych badaniach -



Umieralność - 2024

liczba 22
 współczynnik 1,6


Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. wielkopolskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 29.827
 Ludność 30 VI 2025 3 474 825
 Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 95 104

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów	97,0%
z kontaktów	-
w badaniach profilaktycznych	1,2%
w innych badaniach	1,8%



SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań	177
współczynnik zapadalności	5,1
miejsce w rankingu	1
w tym:	

nowe zachorowania - liczba	155
współczynnik	4,5
wznowy - liczba	22
współczynnik	0,6
gruźlica płuc - liczba	168
współczynnik	4,8
gruźlica pozapłucna - liczba	9
współczynnik	0,3
% ogółu zachorowań	5,1%


zachorowania wśród dzieci

liczba	2
współczynnik	0,4

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba	167
współczynnik	4,8
% ogółu zachorowań	94,4%

w tym:	
gruźlica płuc - liczba	159
współczynnik	4,6
% ogółu gruźlicy płuc	94,6%
miejsce w rankingu	1
gruźlica pozapłucna - liczba	8
współczynnik	0,2
% gruźlicy pozapłucnej	88,9%




Umieralność - 2024

liczba	27
współczynnik	0,8

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy -
 Liczba chorych z wielolekową lekoopornością -

Krótką charakterystyka sytuacji epidemiologicznej i realizacji programu zwalczania gruźlicy w woj. zachodniopomorskim w 2025 r.



Powierzchnia w km² 22.909
Ludność 30 VI 2025 1 617 418

Produkt krajowy brutto PKB na 1 mieszkańca - 2023 r. 74 398

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

Zapadalność ogółem

liczba zachorowań 176
współczynnik zapadalności 10,9
miejsce w rankingu 10

w tym:

nowe zachorowania - liczba 159
współczynnik 9,8
wznowy - liczba 17
współczynnik 1,1
gruźlica płuc - liczba 172
współczynnik 10,6
gruźlica pozapłucna - liczba 4
współczynnik 0,2
% ogółu zachorowań 2,3%

zachorowania wśród dzieci

liczba 1
współczynnik 0,5

Zapadalność potw. bakteriologicznie

ogółem liczba 151
współczynnik 9,3
% ogółu zachorowań 85,8%



w tym:

gruźlica płuc - liczba 149
współczynnik 9,2
% ogółu gruźlicy płuc 86,6%
miejsce w rankingu 7
gruźlica pozapłucna - liczba 2
współczynnik 0,1
% gruźlicy pozapłucnej 50,0%

Liczba chorych z lekoopornością na co najmniej 1 lek p/prątkowy 35
Liczba chorych z wielolekową lekoopornością 25

Wykrywanie gruźlicy płuc

z objawów 98,8%
z kontaktów 0,6%
w badaniach profilaktycznych -
w innych badaniach 0,6%



Umieralność - 2024

liczba 20
współczynnik 1,2

09

INFORMACJE OGÓLNE

WOJEWÓDZKIE STACJE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

1. DOLNOŚLĄSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Skłodowskiej Curie 73/77, 50-396 WROCŁAW tel. 71/328-30-41 do 49, fax (71) 328-35-92 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mgr inż. Małgorzata Sienkiewicz	2. KUJAWSKO-POMORSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Kujawska 4, 85-031 BYDGOSZCZ tel. 52/376-18-00, fax (52) 345-98-40 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Wojciech Koper
3. LUBELSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Pielęgniarek 6, 20-708 LUBLIN tel. 81/743-42-72 do 75, fax 81-743-46-86 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Piotr Dreher	4. LUBUSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Mickiewicza 12 b, 66-400 GORZÓW WLKP. tel. 95/722-60-57, fax 95-722-46-52 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dorota Konaszczuk
5. ŁÓDZKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Wodna 40, 90-046 ŁÓDŹ tel. 42/253-62-00, fax 42-253-62-19 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Urszula Jędrzejczyk	6. MAŁOPOLSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Prądnicka 76, 31-202 KRAKÓW tel. 12/25-49-555, fax 12-416-20-93 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Andrzej Hawranek
7. MAZOWIECKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Żelazna 79, 00-875 WARSZAWA tel. 22/620-90-01 do 06, fax 22-624-82-09 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk	8. OPOLSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Mickiewicza 1, 45-367 OPOLE tel. 77/442-69-00, fax 77-442-69-04 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Anna Matejuk
9. PODKARPACKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Wierzbowa 16, 35-310 RZESZÓW tel. 17/852-21-11, fax 17-852-22-92 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dr inż. Adam Sidor	10. PODLASKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Legionowa 8, 15-099 BIAŁYSTOK tel. 85/740-85-40, 85-740-48-99 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dr n. med. Ewa Siewko
11. POMORSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Dębniaki 4, 80-211 GDAŃSK tel. 58/344-73-00, fax 58-520-32-53 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Anna Obuchowska	12. ŚLĄSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. Raciborska 39, 40-957 KATOWICE tel. 32/351-23-00, 32-351-23-18 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dr n.med. Grzegorz Hudzik

13. ŚWIĘTOKRZYSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Jagiellońska 68, 25-734 KIELCE tel. 41/351-23-00, fax 41-345-18-73 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Ciura	14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-560 OLSZTYN tel. 89/824-83-00, fax 89-527-97-88 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko
15. WIELKOPOLSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Noskowskiego 23, 61-705 POZNAŃ tel. 61/854-48-00, fax 61-852-50-03 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Mgr Paweł Gilewski	16. ZACHODNIO-POMORSKIE Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Spedytorska 6/7, 70-632 SZCZECIN tel. 91/462-40-60, fax 91-462-46-40 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, tel. (22) 43-12-100 (centrala)

Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
tel.: 43-12-428, fax: 43-12-452

Z-ca dyrektora ds. leczenia: lek. med. Wojciech Skorupa
tel.: 43-12-428, fax: 43-12-452

Z-ca dyrektora ds. techniczno- administracyjnych: Mgr inż. Marek Marszałkowski
tel.: 43-12-428, fax: 43-12-452

Z-ca dyrektora ds. zarządzania i organizacji: Mgr Małgorzata Pacuszka
tel.: 43-12-428, fax: 43-12-452i

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc:

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke,

Zakład Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą:

Kierownik Zakładu:

Dr hab. n. med. Adam Nowiński, prof. IGiChP tel. 43-12-123

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Maria Korzeniewska-Koseła

- rejestracja nowych zachorowań tel. 43- 12-180

- sprawozdania MZ-13 tel: 43-12-153

Zakład Mikrobiologii:

Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, tel/fax.: 43-12-182

Zakład Fizjopatologii Oddychania:

Kierownik Zakładu:

Dr hab. n. med. Stefan Wesołowski, prof. IGiChP tel: 43-12-223, fax: 43-12-426

I Klinika Chorób Płuc:

Kierownik Kliniki – dr hab. n. med. Małgorzata Sobiecka, tel.: 43-12-143, fax: 43-12-443

II Klinika Chorób Płuc:

Kierownik Kliniki – Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, tel.: 43-12-144, fax: 43-12-454

III Klinika Chorób Płuc: Prof. dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros, tel. 22 43 12 108

Klinika Nowotworów Klatki Piersiowej

KIEROWNIK KLINIKI – Dr n. Med. Mateusz Polaczek, tel.: 43-12-108, FAX: 43-12-408

KLINIKA CHIRURGII

Kierownik Kliniki - Prof. dr hab. n. med. Tadeusz M. Orłowski tel.: 43-12-266, fax: 43-12-455

Przychodnia Przychodnia:

Kierownik Przychodni – Dr n. med. Krystyna Maszkowska-Kopij tel.: 43-12-118, fax: 43-21-424

